

BotaniGard 10,7 SC

Βιολογικό εντομοκτόνο

επαφής με βάση ζωντανά σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana*, για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες και κίτρινου τετράνυχου σε καλλιέργεια φράουλας.

Αρ. εγκρ. κυκλ. 14302/ 23-10-2008

**Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.**



ΠΙΠΤΕΧΟΜΕΝΟ:

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης, αλλά όχι μέχρις απορροής, λόγω πιθανής έκπληξης των κονιδίων του μύκητα από το φύλλωμα. Να μην χρησιμοποιούνται ακροφύσια με διάμετρο μικρότερη από 25 MESH.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε καλά το δοχείο πριν την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και αφού βάλουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος το συμπληρώνουμε με νερό αναδεύοντας συνεχώς. Η ανάδευση να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται αμέσως μόλις ετοιμαστεί το ψεκαστικό υγρό. Το ψεκαστικό δοχείο δεν πρέπει να περιέχει υπολείμματα προηγούμενου ψεκαστικού υγρού που περιέχει μυκητοκτόνα

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συστατιζόμενες καλλιέργειες και δόσεις, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Συνδυαστικότητα: Να μην συνδυάζεται με μυκητοκτόνα σκευάσματα

Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μη χρησιμοποιείτε **το προϊόν κατά την περίοδο** που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυνέες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 4 ώρες μετά την χρήση.

Να αποφεύγεται η απ' ευθείας έκθεση των ωφελίμων αρθρώσεων στο BOTANIGARD 10,7 SC. Η εξαπόλυση ωφελίμων αρθρώσεων στα θερμοκήπια να γίνεται μετά την επέμβαση με BOTANIGARD 10,7 SC και αφού στεγνώσει το φύλλωμα των φυτών.

Σε περίπτωση που πρόκειται να γίνει εφαρμογή του σκευάσματος σε βιολογική καλλιέργεια ελιάς, θα πρέπει: οι κυνέες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή που εφαρμόζεται το σκεύασμα να μείνουν κλειστές για 1 ημέρα και η αρμόδια Υπηρεσία να ειδοποιεί τους μελισσοκόμους της περιοχής με ανακοίνωση να κρατήσουν τις κυνέες κλειστές.

Τέλευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής

Beauveria bassiana 10,735%

Συμπυκνωμένο εναώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: *Beauveria bassiana* 10,735% β/ο
βοηθητικές ουσίες: : 83,79% β/β



FUTURECO
bioscience

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ
ΕΙΣΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

BotaniGard 10,7 SC

Προφυλάξεις

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.

Κατά την διάρκεια ψεκασμού χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 30 °C

Σε περίπτωση εισόδου στον αγγό πριν τη διάλυση 4 ωρών από την εφαρμογή του προϊόντος, να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μύσκα.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα από το χώρο που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος και αφήστε τον να ηρεμήσει

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο), και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποδοθούν σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό, σε κανονικές θερμοκρασίες (20-25 °C) και πάντως όχι πάνω από 35 °C, μακριά από το απ' ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες το προϊόν διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρاسκευής του.

Αριθμό παρτίδας/Ημερο. Παρασκευής: βλέπε επί της συσκευασίας

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/μεσοδιάστημα επιτρεπόμενων ημερών
		Κεκ σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. Υγρό *	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ)		
Τομάτα (υπαίθριον και θερμοκηπίου)	Αλευριώδης (Trialetodes vaporariorum, Bemisia tabaci)	125 - 250	70 - 100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Πιπερριά (υπαίθριον και θερμοκηπίου)	Θρίπας (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci)	125 - 250	80	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Φράουλα	Τετράνυχος (Tetranychus urticae)	125 - 250	150-250	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Ροδακινιά	Μύγα της Μεσογείου	125 - 250	150-250	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Μανταρινιά	Μύγα της Μεσογείου	125 - 250	200 - 400	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Κερασιά	Μύγα των κεραστών (Rhaagoletis cerasi)	125 - 250	150-250	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Εκτο- Γμνο για την βολονική καλήγρινη, ως συμπληρωματικό προς τις μερικές πενταμύριες	Δάκος	125 - 250	150-300	Ανάλογα με τις συλλήψεις των ενήλικων ατόμων δάκων στις παγίδες	5 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

* Το εύρος της δόσης είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων

Παρατηρήσεις:

1. Η εφαρμογή του σκευάσματος να διενεργείται κατά τις πρώτες προινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή και τα ενήλικα είναι λιγότερο δραστήρια. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30 °C. Σε περίπτωση παραιτεταμένης βροχόπτωσης συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού.

2. Γενικά να εφαρμόζεται όταν οι πληθυσμοί των εντόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων δύνανται να συνδυαστεί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα, περιλαμβανομένων των θερμικών παραφινικών λαδιών. Η εφαρμογή του σε συνδυασμό με προσκολλητικό μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του.

3. Να μην γίνει χρήση μυκητοκτόνου σκευάσματος σε καλλιέργειες που ψεκάστηκαν με BOTANIGARD SC, εάν δεν περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες από την εφαρμογή του.



ANTHESIS

Κάτοχος της Έγκρισης/
Υπεύθυνος για την Ελλάδα συσκευασίας και σήμανσης:
FUTURECO BIOSCIENCE S.L., Ισπανία.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ανθής ΕΠΕ, Εγ. Μεσογείων 8, 345 61 Κορινθία
τηλ. 210 80 12 367, Fax. 210 82 33 196
Παρασκευαστής του σκευάσματος:
LAVELAN INTERNATIONAL CORPORATION, ΗΠΑ
Διευθυντής από:
Ανθής ΕΠΕ, Εγ. Μεσογείων 8, 345 61 Κορινθία
τηλ. 210 80 12 367, Fax. 210 82 33 196

