

CHECK 50 WP



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ			ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		γρμμ. σκευάσματος/ 100 lt ψεκαστικού υγρού	γρμμ. σκευάσματος/ στρέμμα	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρο/στρέμμα)		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ φρουτ, Κίτριά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Νεραντζιά	Κορυφοξήφρα (Phoma tracheiphila) Σεπτορίωση (Septoria spp.) Φυτόφθορα καρπών (Phytophthora spp.)	190	240-480	125-250	3	Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Εφαρμογή το δεύτερο 15/9ήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 m από το έδαφος.
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ	Κηλίδωση φύλλων (Polystigma ochraceum)	160	160-240	100-150	3	Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φρουσκώσουν τα μέρη.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ	Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas spp.)	160	160-240	100-150	3	Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές: α) Μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β) Όταν πέσει το 75% των φύλλων.
ΚΑΡΥΔΙΑ	Ανθράκνωση (Marsoriina juglandis) Κηλίδωση φύλλων & καρπών (Xanthomonas juglandii)	160	160-240	100-150	4	Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες.
ΦΥΣΤΙΚΙΑ	Σεπτορίωση (Septoria spp.)	160	160-240	100-150	4	Εφαρμογές: α) Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β) Όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 cm, γ) Μετά από 20 ημέρες, δ) Αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, Venturia pirina) Σεπτορίωση (Septoria spp.) Φαίά Σήψη (Sclerotinia laxa) Βακτηριώση (Pseudomonas syringae) Βακτηριακό κένωμα (Erwinia amylovora)	250	250-500	100-200	3	Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν τη πτώση των φύλλων και στα στάδια της πρόσσης και ροδίσης κορυφής, εφ' όσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών. Στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια συνιστώνται δύο (2) εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερυκοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά	Κορίνιο (Stigmata carporrhila) Εξώασκος (Taphrina deformans) Κλαδοσπορίωση (Cladosporium carporrhilium) Φαίά Σήψη (Sclerotinia laxa) Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas spp.)	170	170-200	100-120	4	Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές: α) Το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) Στο τέλος του χειμώνα πριν τη διάγκωση των οφθαλμών. Εφαρμογές στη διάγκωση των οφθαλμών και στη ροδίση κορυφή. Σε περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφύλια)	Περωνόσπορος (Plasmopora viticola) Ανθράκωση (Elsinoe ampelina)	260	130-400	50-150	3	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 cm, μετά από 10 ημέρες λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
ΕΛΙΑ	Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum, Spilocaea oleagina) Γλοιοσπόριο (Gloeosporium olivarium) Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi)	260	390-800	150-300	2	Δύο εφαρμογές: Η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 cm. Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Καρότο, Ραπανά, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Πρόσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Αγκινάρα, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι	Περωνόσπορος (Peronospora sp., Bremia lactucae) Κλαδοσπορίωση (Cladosporium fulvum) Σεπτορίωση (Septoria spp.) Ανθράκνωση (Colletotrichum spp.)	240	120-240	50-100	3	Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΤΟΜΑΤΑ (Υ + Θ)	Περωνόσπορος (Phytophthora infestans) Βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas campestris)	250	125-250	50-100	2	Προληπτικές εφαρμογές εφ' όσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και εφ' όσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της.
ΠΑΤΑΤΑ	Περωνόσπορος (Phytophthora infestans)	240	120-240	50-100	2	Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 cm και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ	Κερκοσπορίωση (Cercospora beticola)	350	140	40	3	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Περωνόσπορος (Peronospora spp.) Φυτόφθορα (Phytophthora spp.)	280-350	140-350	50-100	2	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανισθεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
- Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί σε υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφ' όσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Στις καλλιέργειες Αμπέλι, Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Πατάτα, Ελιά και Λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

CHECK 50 WP

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά (**S1/2**).
- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές (**S13**).
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε (**S20/21**).
- Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό (**S22**).
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια (**S24/25**).
- Με φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια (**S36/37**).
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, όπου είναι δυνατόν) (**S 45**).
- Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων (**S 56**).
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα (**S60**).
- Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδωμένων ασφαλείας (**S61**).
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλλαμίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (R50/53)

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (SP1). Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

CHECK 50 WP

COPPER OXYCHLORIDE (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ), Cu 50%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μεταλλικός Χαλκός (σε μορφή Οξυχλωριούχου Χαλκού) : 50.00% B/B
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Industrias Quimicas del Valles (IQV) S.A., Ισπανία
Βοηθητικές ουσίες : 10.71% B/B

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP) ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ (S1/2)

Xn



• ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ (R22)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.&Τ.: 6618/15.5.95

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘΜ. 889/2008/ΕΚ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AGROTECHNICA OΒΕΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A., Ισπανία



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112 , 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 κιλό (kg)

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βθέπε
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: συσκευασία

CHECK 50 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται με ψεκασμούς φυλλώματος.
- ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
- ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά μετά το φρούσκωμα των οφθαλμών, καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες της μηλιάς Golden Delicious, Jonathan, Renetta και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά, να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος κατά την άνθηση.
- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικούς πολτούς, με σκευάσματα mancozeb, maneb, thiram, captan, folpet και με ισχυρά οξέα και αμιωνία.
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες): Εσπεριδοειδή: 21, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φυστική, Φουντουκιά): 28, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 21, Ελιά: 21, Λαχανικά (Υ + Θ): 7, Τομάτα Υπαίθρου: 10, Θερμοκηπίου: 7, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21.
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σασκούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγούμενος με σκίσιμο για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
- ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Η αποθήκευση του σκευάσματος να γίνεται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

