



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης πλην δασικών και μανιταριών)

β) Ψεκασμοί εδάφους (για τα δασικά)

γ) Ποτίσματα μόλις ετοιμαστούν τα κασόνια (για τα μανιτάρια)

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή: (λεμονιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά, γκρέιφ φρουτ, φράππα) Για την καταπολέμηση του σκωριόχροου άκαρι ή άκαρι της φλούδας συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος με 150 γραμ./100 λίτρα νερό. Ο πρώτος μετά την άνθιση, ο δεύτερος το καλοκαίρι και ο τρίτος το φθινόπωρο.

Όγκος ψεκ. υγρού: 200-400 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 3

Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά: Για την καταπολέμηση της καρπόκαψας μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς, συνιστώνται ψεκασμοί φυλλώματος με 40-60 γραμ./100 λίτρα νερό. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται όταν γεννιούνται τα αυγά ή πριν την εκκόλαψη των αυγών (μία βδομάδα νωρίτερα από τα συνηθισμένα εντομοκτόνα). Οι ψεκασμοί συνεχίζονται κάθε 4 εβδομάδες ή την εμφάνιση κάθε νέας γενιάς. Για την καταπολέμηση των φυλλορικτών και της νάρκης συνιστώνται ψεκασμοί με 50-60 γραμ./100 λίτρα νερό κατά τη διάρκεια της γέννησης των αυγών αλλά πριν την εκκόλαψη των αυγών. Για την καταπολέμηση της ψύλλας της αχλαδιάς συνιστώνται ψεκασμοί με 60-120 γραμ./100 λίτρα νερό μετά την άνθιση όταν αρχίζουν να εκκολάπτονται τα αυγά ή στα πρώτα προνυμφικά στάδια και επανάληψη ψεκασμού μετά από 3-4 βδομάδες.

Όγκος ψεκ. υγρού: 100-200 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 4

Βερικοκιά, δαμασκηλιά: Για την καταπολέμηση της καρπόκαψας της βερικοκιάς και της δαμασκηλιάς συνιστώνται ψεκασμοί με 80-150 γραμ./100 λίτρα νερό. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται μετά τη γέννηση των αυγών και επαναλαμβάνεται μετά από 3-4 βδομάδες.

Όγκος ψεκ. υγρού: 150-250 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 2

Ροδακινιά: Για την καταπολέμηση της καρπόκαψας και ανάρσιας της ροδακινιάς συνιστώνται ψεκασμοί με 40-80 γραμ./100 λίτρα νερό. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται 2 μήνες πριν και ο δεύτερος 1 μήνα πριν τη συγκομιδή.

Όγκος ψεκ. υγρού: 150-250 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 2

Ελιά: Για την καταπολέμηση του πυρηνωτήτη συνιστάται ψεκασμός με 40-80 γραμ./100 λίτρα νερό στην αρχή της άνθισης για την καταπολέμηση της 2ης γενιάς και την εμπόδιση της ανάπτυξης της 3ης γενιάς.

Όγκος ψεκ. υγρού: 150-300 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 1

Τομάτα: (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού και σποντόπτερας συνιστώνται ψεκασμοί με 40-60 γραμ./100 λίτρα νερό, πριν την εκκόλαψη των αυγών και επανάληψη (περίπου κάθε μήνα).

Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. (υπαίθρου) και 50-200 (θερμοκηπίου)

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 3

Λάχανο: (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Για την καταπολέμηση της πιερίδας, μαμίστρας, επιλάχνας και γεωμέτρης συνιστώνται ψεκασμοί με 40-100 γραμ./100 λίτρα νερό, πριν την εκκόλαψη των αυγών και επανάληψη (περίπου κάθε μήνα).

Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 3

Πατάτα (πρώιμη): Για την καταπολέμηση του δορυφόρου συνιστώνται ψεκασμοί με 40-100 γραμ./100 λίτρα νερό, πριν την εκκόλαψη των αυγών και επανάληψη (περίπου κάθε μήνα).

Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 3

Βαμβάκι, τριφύλλι: Για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού και σποντόπτερας συνιστώνται ψεκασμοί με 40-100 γραμ./100 λίτρα νερό πρώτου οι προνύμφες μπουν μέσα στα καρύδια για το βαμβάκι και με την εμφάνιση της προσβολής για το τριφύλλι.

Όγκος ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. (βαμβάκι) και 50-100 λίτρα/στρ. (τριφύλλι)

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 1

Μανιτάρια: Για την καταπολέμηση ειδών μυγίστας συνιστάται πότισμα με 4 γραμ./2,5 λίτρα νερό/τ.μ. μόλις ετοιμαστούν τα κασόνια.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 1

Δασικά: Καταπολέμια κάμπια του πεύκου (πυτιοκάμπη), κάμπια της βελανιδιάς, λυμάντρια, καρπόκαψα των κασάνων και διάφορα φυλλοφάγα έντομα. Συνιστάται δόση με ψεκασμούς εδάφους 30-60 γραμ./100 λίτρα νερό/στρέμμα. Οι ψεκασμοί συνιστάται να γίνουν με την εκκόλαψη των αυγών και όσο οι κάμπιες είναι μικρές. Επανάληψη μετά από 30-40 μέρες. Ειδικά για την κάμπια των πεύκων η καλύτερη εποχή είναι το φθινόπωρο μόλις εμφανιστούν οι πρώτες κάμπιες. Για την Β. Ελλάδα η εποχή αυτή είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου.

Για την Ν. Ελλάδα και τις υπόλοιπες θερμές περιοχές είναι μέσα Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου.

Όγκος ψεκ. υγρού: 200-400 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 2

Καλλωπιστικά: Για την καταπολέμηση της λυμάντριας και σποντόπτερας συνιστάται δόση με 30-60 γραμ./100 λίτρα νερό μόλις αρχίσει η εκκόλαψη των αυγών και όσο οι κάμπιες είναι ακόμα μικρές.

Όγκος ψεκ. υγρού: 50-200 λίτρα/στρ

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο: 2

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με-
χρι τη μέση με νερό.

- Διαλύουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού

και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με βιολογική δράση (παρεμποδιστής βιοσύνθεσης της χητίνης). Δρα κατά το στάδιο της εκκόλαψης των αυγών ή της αποδερμάτωσης των προνυμφών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Δένδρα: 30 μέρες
- Τομάτα: 45 μέρες
- Ελιά: Στην αρχή της άνθησης
- Λοιπές καλλιέργειες: 21 μέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δε συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολύτο και ισχυρώς αλκαλικά σκευάσματα.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΒΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΗΜ. ΑΗΕΗΣ: ΒΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Καθαρό βάρος: **500 γραμ.**



diflubenzuron
(ντιφλουμπενζουρόν) 25%

Βρέξιμη Σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση: **diflubenzuron 25 % β/β**
Βοηθητικές ουσίες: 73,7 % β/β

Εντομοκτόνο με βιολογική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 1265/26.2.1980.

Παρασκευαστής - Τυποποιητής - Συσκευαστής:
CHEMTURA NETHERLANDS B.V.,
Ολλανδία



@ Σήμα κατατεθέν της
CHEMTURA CORPORATION

GR-D25-195-04 (11/11)



Κάτοχος έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Υδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280

15232 Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ: 210 688 9777, 9778

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παι-διά

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
- Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα από την περιοχή εφαρμογής και ζητείστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης: ο παθόντας θα πρέπει να ξεπλύνει καλά το στόμα του και εν συνεχεία να πει πολύ νερό με ενεργό άνθρακα. Να ζητηθεί αμέσως ιατρική συμβουλή. Ο γιατρός θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να προκληθεί εμετός.

Μη δώσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπε σε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρουσιαστεί δερματικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:
(210) 77 93 777

Προσοχή!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΤΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Α ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ