

Metaldehyde®

OXON 5GB

metaldehyde (μεταλδεύδη)
Κοκκώδες δόλωμα GB

Εγγυημένη Σύνθεση:
metaldehyde 5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 94,9% β/β

**Κοκκώδες Κοχλιολειμακοκτόνο δόλωμα
για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων.
Δρα από στομάχου.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Αρ. Εγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Αναπτ. & Τροφ.: 5019/ 21-4-2008.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, Ήρας 3, 194 00 Κορωπί, Τηλ. 210 522 3834
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Παρασκευαστής: OXON ITALIA SpA, Ιταλία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. **Η εφαρμογή να γίνεται αυστηρά με μηχανικά μέσα.** • Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύντε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών:** Απομακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή που εφαρμόστηκε το σκεύασμα. Αν χρειαστεί ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 14 ΗΜΕΡΕΣ. ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΗΜΕΡΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Σκορπίζεται μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων γύρω από τα φυτά και τα δένδρα. Εφαρμόζεται και στη γραμμή σποράς σε πλάτος 20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει τη μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές.

Πεδίο εφαρμογής: Σπορεία, φυτώρια, λαχανόκηποι, ανθοκομικές καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελώνες, καλλιεργούμενοι αγροί.

Εχθρός: Κοχλίες (σαλιγκάρια). Γυμνοσαλιάγκες (λείμακες, αρίονες). Δόσεις σκευάσματος: 0,7 – 1 Χιλιόγραμμα το στρέμμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του πληθυσμού των κοχλίων/λειμάκων. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες η ποσότητα του σκευάσματος ανά δένδρο είναι περίπου 30 γραμμάρια.
- Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.
- Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.
- Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.
- Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδάσματα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα για κατανάλωση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και τρόπο εφαρμογής

Συνδυαστικότητα: — —

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ανάκτηση ενέργειας.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας:



SIPCAM