

Προφυλάξεις: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Πρώτες Βοήθειες- Αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: **Γενικά:** Μετακινείτε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και μετατεθείστε τον από υποθερμία. Συμβουλευτείτε προληπτικά γινά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εάν είναι δυνατόν. Μην προκαλέσετε εμετό. **Ειδικές οδηγίες:** Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνους απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπασμούς. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 2 μήνες από την εφαρμογή του. Αποφύγετε την χρήση του σε πολύ αμυδιώδη εδάφη. Μη ρυπαίνετε τις γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Εάν ρυπανθούν τα νερά αρδύσεων, να μη χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 PSI). Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συστήνεται. Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορριπτικά.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Είναι φυτοεξικό στα σπάρτα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνονται τριπλό ξεπλύσιμο (να νερά του ξεπλύματος να ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή κεντρική ενέρειξη.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης: Παραμένει σταθερό για (δύο) 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνθήκες θερμοκρασίας.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας:



FLUAZIFOP-P-BUTYL-SHARDA BALKAN

12,5 EC

Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluzazifop-P-Butyl 12,5% β/β.

Βοηθητικές ουσίες: 85,06% β/β

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την μεταφωτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε πλατύφυλλες καλλιέργειες. Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται μέσα στα φυτά στους υπέργειους και υπόγειους ιστούς των φυτών.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

• Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. • Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης. • Βλαβερές: μπορεί να προκαλέσει έλθει στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. • Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υπόδινο περιβάλλον. Μέτρια βλαβερό για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Αριθμός έγκρισης: 7857/22.04.2008

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, Ήρας 3, 194 00 Κορωπί, Τηλ. 210 522 3834

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Π. Μελά 1, 152 33, Χαλάνδρι

Παρασκευαστής: SHARDA WORLDWIDE EXPORT PRIVATE Ltd., Ινδία

Εργοστάσιο παρασκευής -

συσκευασίας: I.R.C.A. Service S.p.A., Ιταλία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



SIPCAM

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρέμμα)-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-60

Ζαχαρότευχλα: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριοβρώμη (Avena spp.), Μουχρίτσα (Echinochloa spp.), Σετάρια (Setaria spp.)- 100-200 (1) - Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα.

Αμπέλι(για οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια): Πολυετή Αγρωστώδη ζιζάνια: α) Βέλιουρας(Sorghum spp.) - 600 β) Αγριάδα (Cynodon dactylon) - 800-1000 - Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος)

Εσπεριδοειδή: ΚΡΕΠΙ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Αγρωστώδη ζιζάνια: α) Ετήσια β) Πολυετή (3) - 60-120 (2) - α) Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα β) Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος)

Βαμβάκι, Τριφύλλι για σπόρο, Καπνός, Σόγια, Ηλιανθος, Πατάτα, Φακή: Αγρωστώδη ζιζάνια α) Ετήσια β) Πολυετή (3)- 100-250 (2) (απαιτείται προσθήκη ελαίου ή διαβρεκτικού)- α) Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα β) Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος)

Μαρούλι: Ετήσια αγρωστώδη-125-150- Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα. Πολυετή αγρωστώδη-150-200- Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης.

Τομάτα Υπαίθρου (Βιομηχανική): Ετήσια αγρωστώδη *- 125-150 - Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα, βέλιουρας-150-200 - Όταν ο βέλιουρας βρίσκεται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλικής επιφάνειας των ζιζανίων, όταν τα πολυετή βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης και τα ετήσια στο στάδιο 1-3 φύλλων, με 30-60 λίτρα νερό/στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε κατά το ½-2/3 το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Ανακινήστε τη φιάλη με το σκεύασμα και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα. Ξεπλύνετε τα κενά συσκευασίας πολλές φορές και ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού υπό συνεχή ανάδευση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στα ζαχαρότευχλα για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους, η χαμηλή δόση εφαρμόζεται στα μικρά ζιζάνια και η υψηλή στα μεγάλα. 2. Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή. 3. Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (Poa annua). 4. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι: α) Ετήσια: αγριοβρώμη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), σετάρια (Setaria spp.), μουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώμος (Bromus spp.), Αλεπουσουρά (Alopecurus spp.), αματόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή: βέλιουρας (Sorghum spp.). 5. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%. 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση για τομάτες βιομηχανικές βιολογικού κύκλου μικρότερου των 90 ημερών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ζαχαρότευχλα: 90 ημέρες Αμπέλι: 120 ημέρες, Εσπεριδοειδή-βαμβάκι: 30 ημέρες, Πατάτα: 50 ημέρες Σόγια —ηλιανθος-τριφύλλι-καπνός-60 ημέρες, Φακή: 45 ημέρες, Μαρούλι: 42 ημέρες, Τομάτα Υπαίθρου (Βιομηχανική): 90 ημέρες

Μείνιστος αριθμός εφαρμογής ανά καλλιερητική περίοδο: 1