

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

■ Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ■ Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ■ Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ■ Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. ■ Να φοράτε κατάλληλα γάντια. ■ Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ■ Οι εργάτες δε θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. ■ Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος: Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε ανείσθητο άτομο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**1090 g e****Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)**

Tribenuron-methyl (τριμπενουρόν μεθύλ)	10 g/kg
Mecorprop-P (μεκοπρόπ-π)	734 g/kg

Εγγυημένη σύνθεση :

Tribenuron-methyl	1 % β/β
Mecorprop-P	73,4 % β/β
Βοηθητικές ουσίες	19,17 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά
(μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

*The miracles of science™*

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
7948/16-2-2011

Παρασκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S.,
Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 και Α.Κηφισίας 280

153 32 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής και συσκευαστής:**DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Xn

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία
του.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΧΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ**N**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος -
συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια .

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ****ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:****ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:**

CYAN MAGENTA JAUNE BLACK



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

■ Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ■ Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ■ Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ■ Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. ■ Να φοράτε κατάλληλα γάντια. ■ Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ■ Οι εργάτες δε θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. ■ Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος: Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε ανείσθητο άτομο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

1090 g e

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Tribenuron-methyl (τριμπενουρόν μεθύλ)	10 g/kg
Mecorprop-P (μεκοπρόπ-π)	734 g/kg

Εγγυημένη σύνθεση :

Tribenuron-methyl	1 % β/β
Mecorprop-P	73,4 % β/β
Βοηθητικές ουσίες	19,17 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά
(μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

Granstar® Combi SG
Ζιζανιοκτόνο



The miracles of science™

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
7948/16-2-2011

Παρασκευαστής:

DuPont de Nemours (France) S.A.S.,
Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υδρας 2 και Α.Κηφισίας 280

153 32 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής και συσκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία
του.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
συνθήκες αποθήκευσης: 2 χρόνια .



3 576960 050869



Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Tribenuron-methyl
(τριμπενουρόν μεθύλ)
Mecorprop-P (μεκοπρόπ-π)

10 g/kg
734 g/kg

Εγγυημένη σύνθεση :
Tribenuron-methyl
Mecorprop-P
Βοηθητικές ουσίες

1 % β/β
73,4 % β/β
19,17 % β/β

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση πλατύφυλλων
ζιζανίων στα σιτηρά
(μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
7948/16-2-2011

Παρασκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος
διάθεσης στην αγορά - Διανομέας:

NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280
153 32 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 688 9700

Τυποποιητής και συσκευαστής:
DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

■ Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ■ Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ■ Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ■ Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. ■ Να φοράτε κατάλληλα γάντια. ■ Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ■ Οι εργάτες δε θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν. ■ Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. ■ Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος: Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Χη



**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ**

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτάρι πριν περάσουν **90 μέρες** από την εφαρμογή του GRANSTAR COMBI 74,4 SG.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **5** μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **10** μέτρων από τη μη γεωργική γη.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το GRANSTAR COMBI 74,4 SG, είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι). Είναι μίγμα του mecorgror-p και του tribenuron methyl. Το mecorgror-p απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου του συμπλάστη και αποπλάστη, συσσωρεύεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς και επηρεάζει την κυτταρική

διαίρεση, όπως και οι φυσικές αυξίνες. Το tribenuron-methyl δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθέτωση του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το $\frac{3}{4}$ με νερό και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και προσθέτουμε το επιφανειοδραστικό. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά (βλ. ειδικές προφυλάξεις) μετά τη χρήση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**Καταπολεμούμενα ζιζάνια****Ευαίσθητα ζιζάνια:**Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*)Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)Μπιφόρα (*Bifora radians*)Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*)Καρδαμίνη (*Cardamine hirsute*)Λουβουδιά (*Chenopodium album*)Κίρσιο (*Cirsium arvense*)Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*)Γαλέοψη (*Galeopsis tetrahit*)πορφυρό Λάμιο (*Lamium purpureum*)Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*)Ρανούγκουλος (*Ranunculus arvensis*)Αλμυρίδι (*Salsola kali*)άγριο Σινάπι (*Sinapis arvensis*)Σισύμπριο (*Sisymbrium sp.*)Κοινός αγριοπανσές (*Viola arvensis*)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*)μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (*Galium aparine*)μικρόκαρπη Κολλητσίδα (*Galium spurium*)Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*)Βερόνικα (*Veronica hederifolia*)Μυρώνι (*Scandix pecten-veneris*)**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), κριθάρι: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων συνιστάται ψεκασμός σε δόση 109 γραμ. σκ./στρέμμα από το στάδιο του αδελφώματος της καλλιέργειας μέχρι το στάδιο των δύο γονάτων.

Η προσθήκη του μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.05% κατ' όγκο ή του ελαιούχου επιφανειοδραστικού CODACIDE EC σε δόση 100 ml/στρέμμα είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο 2-6 φύλλων.
2. Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του, ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
3. Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες.

4. Η προσθήκη προσκολλητικού είναι απαραίτητη για τη σωστή δράση του προϊόντος.

5. Να μη γίνεται ψεκασμός αν έχει παγωνιά ή ξηρασία, ή αν αναμένεται βροχή μέσα σε 2 ώρες.

6. ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ GRANSTAR COMBI SG ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

- Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:

- Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην παραμένει υπόλοιπο ψεκαστικού υγρού στο βυτίο. Γεμίστε το άδειο βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
- Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 3%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό.
- Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως.
- Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα.
- Το ψεκαστικό να μην ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Να μην ψεκάζονται σιτηρά που είναι καταπονημένα από παγετό, νεροκρατήματα, ασθένειες κ.λ.π.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με

κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

