

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές συμβουλές: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Αν αισθανθείτε αδιασπασία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Αν εμφανισθούν αναπνευστικές ή άλλες δυσχέρειες κρατείστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευθείτε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Μην προκαλέσετε εμετό ή μη δώσετε τίποτε από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως»

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συνδυαστικότητα: ---

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τριτηθύνουν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

Grisu[®] 50 SC

Iprodione (ιπτροπιον)

Πυκνό αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

iprodione: 50 % (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: 58,2% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μύκητες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

• Υποποτο
καρκινογένεσης

• Πολύ τοξικό για
υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να
προκαλέσει μακρο-
χρόνιες δυσμενείς
επιπτώσεις στο
υδρόβιο περιβάλλον.



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60324/6-6-12

Κάτοχος της έγκρισης: OXON ITALIA S.p.A, Ιταλία
Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Mon. ΕΠΕ, Ηφρα 3, 19400 Κορμπά, Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr

Παρασκευαστής σκευάσματος:
SIPCAM S.p.A., Ιταλία



SIPCAM

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τομάτα θερμοκηπίου: Βοτρύτης (*Botrytis cineria*), Αλτερνάρια (*Alternaria solani*): 100-166,7 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (100 κ.εκ.σκ./στρ.). Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες για βοτρυτή και 10-14 ημέρες για αλτερνάρια. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** 60-100. **Φράουλα θερμοκηπίου:** Βοτρύτης (*Botrytis cineria*), Αλτερνάρια (*Alternaria solani*): 150 κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (150 κ.εκ.σκ./στρ.). Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** 100

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας:

- Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν τους πληθυσμούς των παθογόνων.
- Ελαχιστοποίηση της πίεσης επιλογής με ελαχιστοποίηση του αριθμού των εφαρμογών. Ανάλογα με την καλλιέργεια, να μη γίνονται περισσότερες από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Συνιστάται η χρήση του μόνο ως μέρος ολοκληρωμένου προγράμματος ψεκασμών για όλα τα παθογόνα στόχους και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν ανήκουν στα δικαρβοξυμίδια, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και φαινόλυπυρρόλες.
- Ειδικά για τον Βοτρυτή (παθογόνο υψηλού κινδύνου) όπου η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι υψηλή, χρησιμοποιείται χωρίς κατά την καλλιεργητική περίοδο ένα μη-δικαρβοξυμικό μυκητοκτόνο και εφαρμόστε το GRISU 50SC αργότερα σαν τμήμα προγράμματος ψεκασμών (σε εναλλαγή ως ανωτέρω). Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στο iprodione, διατηρείστε μία καλλιεργητική περίοδο χωρίς έκθεση του παθογόνου στα δικαρβοξυμίδια και εφαρμόστε μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτά (απουσία δικαρβοξυμίδων η συχνότητα των ανθεκτικών στελεχών στον αγρό τείνει να μειωθεί).

Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με pH<6 καθώς υπάρχει κίνδυνος έκπλυσης. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Φράουλα (θερμοκηπίου) 1 ημέρα. Τομάτα (θερμοκηπίου) 3 ημέρες.

Ημερ. Παραγωγής:
Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

