

ΜΗΛΟΕΙΔΗΣ (Μήλη): Αδένεινες: Ολίγο (Podosphaera ucaulicola), Φουκάδαιο (Venturia inaequalis). Δόσεις: 30-40 κ.κ. σκευασμ./100 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι, 30-80 κ.κ. σκευασμ./σπρέι, 100-200 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι. **Χρόνος εφαρμογής:** Στα στάδια της πρόωξης, της ρόμβης κορυφής, της πτώσης των πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα. **ΜΕΛΙΤΙΝΟΕΙΔΗΣ (Μελίτινα):** Αδένεινες: Φουκάδαιο (Venturia pinna, Fusidicium eufobotiae). Δόσεις: 30-40 κ.κ. σκευασμ./100 λίτ. υγρ. υγρο, 30-80 κ.κ. σκευασμ./σπρέι, 100-200 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι. **Χρόνος εφαρμογής:** Στα στάδια πρόωξης κορυφής, μέσης κορυφής, πτώσης των πετάλων, 10-15 ημέρες αργότερα. **ΜΕΛΙΤΙΝΟΕΙΔΗΣ (Μελίτινα):** Αδένεινες: Φουκάδαιο (Venturia pinna, Fusidicium eufobotiae). Δόσεις: 30-40 κ.κ. σκευασμ./100 λίτ. υγρ. υγρο, 30-80 κ.κ. σκευασμ./σπρέι, 100-200 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι. **Χρόνος εφαρμογής:** Στα στάδια πρόωξης κορυφής, μέσης κορυφής, πτώσης των πετάλων, 10-15 ημέρες αργότερα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΙΑ (Βερυκοκία, Ροδάκινά, Νεκταρίνα, Λαμαρκόγια):** Αδένεινες: Ολίγο (Podosphaera oxycantiae, Sphaerotheca pannosa). Δόσεις: 30-40 κ.κ. σκευασμ./100 λίτ. υγρ. υγρο, 45-100 κ.κ.σπρέι, 150-250 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι. **Χρόνος εφαρμογής:** Η πρώτη εφαρμογή γίνεται τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της άνθησης του καλλικά και η 2^η 7-10 ημέρες αργότερα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3. **ΑΜΠΕΛΙΝΑ:** Αδένεινες: Ολίγο (Uncinula necator). Δόσεις: 15-25 κ.κ. σκευασμ./100 λίτ. υγρ. υγρο, 7-37 κ.κ. σκευασμ./σπρέι, 50-150 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι. **Χρόνος εφαρμογής:** Η πρώτη εφαρμογή γίνεται τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της άνθησης του καλλικά και τις επόμενες συνθήκες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3. **ΚΟΛΟΚΥΝΟΕΙΔΗΣ (Αγγούρι, Κολοκύνθη, Καρπούζι, Πεπόνι):** Αδένεινες: Ολίγο (Sphaerotheca sp., Erysiphe sp., Oldium sp.). Δόσεις: 40-50 κ.κ. σκευασμ./100 λίτ. υγρ. υγρο, 20-50 κ.κ. σκευασμ./σπρέι, 50-100 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι. **Χρόνος εφαρμογής:** Η πρώτη εφαρμογή γίνεται τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της άνθησης του καλλικά. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανόληξη ανά 7-10 ημέρες, σπ. στον υπαίθριο προβλεπύ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** Αδένεινες: Ολίγο (Sphaerotheca pannosa), Μελώνη Κρόκων (Diboscaphora rosea). Δόσεις: 30-40 κ.κ. σκευασμ./100 λίτ. υγρ. υγρο, 45-100 κ.κ.σπρέι, 150-250 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι. **Χρόνος εφαρμογής:** Η πρώτη εφαρμογή γίνεται τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της άνθησης του καλλικά. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανόληξη ανά 7-14 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5. **ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ:** Αδένεινες: Σκωρίδα (Phragmidium sp.). Δόσεις: 40-50 κ.κ. σκευασμ./100 λίτ. υγρ. υγρο, 20-50 κ.κ. σκευασμ./σπρέι, 50-100 λίτ. υγρ. υγρο/σπρέι. **Χρόνος εφαρμογής:** Η πρώτη εφαρμογή γίνεται τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της άνθησης του καλλικά. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5.

- Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές εφαρμογές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές.
- Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

120118





• **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμόως καλύψεως. • **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με την μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό το απαιτούμενη δόση σκευασμάτων αναθεωρήσεις καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. • **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες):** Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι: 21, Κολοκυθόσπις: 7. • **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. • **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνδυάζεται με σκευασματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση (π.χ. βορηνόγλυφες πολτός). • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καθα-στραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη δια-σφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. • **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ-ΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, καλά αεριζόμε-νο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Στην συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ**

KEYNILBU 12.5 EC

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ: Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730 Asse, Βέλγιο.
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGROTECHNICA ΟΒΕΕ

Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Θ. 1112 , 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

• Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωο-
τροφές. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το
χρησιμοποιείτε. •Αποφεύγετε την επαφή με το δερ-
μα και τα μάτια. •Το υλικό και ο περιέκτης του
πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο. •Φοράτε
κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και
συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου. •Αποφύ-
γετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε
τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
•Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώμα-
τος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψυκα-
σμό. •Μην ρυπαίνετε τα νερά υδρεύσης ή άρδευσης
με το σκεύασμά ή τα κενά συσκευασίας του.

• **Σε περίπτωση εισπνοής**, μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που δεν αναπνέει. Κλείστε γιατρό.

• **Σε περίπτωση κατάποσης**, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Πιθανόν να χρειαστεί πλήξη στομάχου.

• **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**, πλύνετε τα αμέσως με άθρονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210 77 93 777

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

 X_n 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

size: 59x132x59cm **xn size:** 1.86x2.3 cm **Changing Colors:** 4 (cmyk)
colors: CMYK **n size:** 2.6x2.67 cm **CUTTER**