



**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**  
Διασυστηματικό καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μιζητικών εντόμων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**  
Μισογεμίστε το βυτό με νερό και προσθέστε την απαλτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Διαλύτε καλά με ανάδευση και απογεύμαστε το βυτό. Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίση, τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερό στο ψεκαστικό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται την ίδια μέρα της παρασκευής του. Διάλυμα σε αλκαλικό νερό θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.

• Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστηρό. Αφαίρεστε και καθαρίστε χωριστά με άμβρυνο νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Ξεπλύνατε σχολαστικό το βυτό και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύντε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Επαναλάβετε τη διάλυσης καθαρισμού του βυτού με ακόμα φόρα. Για τον καθαρισμό προτείνεται να χρησιμοποιείται καθαριστικό ψεκαστικόν μεσών ή αμμούλια. Μην καθαρίζετε το ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

• Πριν και κατά την εφαρμογή του μηχανήματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη κουκούλα με προσωπίδα, κατάλληλη κουκούλα με προσωπίδα, γάντια νιτριλίου/νεοπρενίου πάχους μεταξύ 0,4-0,7 χιλ. πάχους, συσκευή προστασίας προσώπου με μάσκα FFA1P3, η οποία προστατεύεται από την εφαρμογή της ίδιας προστατευτικής ενδυμασίας τύπου 3-4 (EN 14605) και γάντια νιτριλίου/νεοπρενίου πάχους μεταξύ 0,4-0,7 χιλ. Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες ζώνες χωρίς εξοπλισμό προστασίας πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή. Για αργοτάκες εργασίες συμπεριλαμβανόμενες κι αυτές εντός 48 ώρων από την εφαρμογή, να λαμβάνετε όλα τα προαναφερθέντα προστατευτικά μέτρα.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (υπαίθρου): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μιζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, των αισημένου σκουρών (*Autographa gamma*), του *Chrysodeixis chalcites*, του πράσινου σκουληκού (*Helicoverpa armigera*), της πυραλίδας (*Ostrinia nubilalis*), της Τούτας (*Tuta absoluta*), της Λυριόμαζας (*Liriomyza sativae*), της σποντόπτερας (*S. littoralis*), της μαύρης αφίδας (*Aphis fabae*), της πράσινης και ροδόχρησης αφίδας (*Macrosiphum euphorbiae*), της πράσινης αφίδας (*Myzus persicae*), της αφίδας κολοκυνθοειδών (*Aphis gossypii*), του Αλευρώδους (*Bemisia tabaci*) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δύση 125 κ.εκ./στρέμμα Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 Μεσοδιάτημα εφαρμογών: 14 ημέρες Όγκος ψεκ.: 100 λίτρα / στρέμμα Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθη, Καρπούζι, Κολοκύνθη (υπαπόντια): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μιζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του αισημένου σκουρών (*Autographa gamma*), του *Mythimna unipuncta*, της σποντόπτερας (*S. littoralis*), της πράσινης αφίδας (*Myzus persicae*), της αφίδας κολοκυνθοειδών (*Aphis gossypii*) και του Αλευρώδους (*Bemisia tabaci*) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δύση 125 κ.εκ./στρέμμα Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 Μεσοδιάτημα εφαρμογών: 14 ημέρες Όγκος ψεκ.: 100 λίτρα / στρέμμα Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθη, Καρπούζι, Κολοκύνθη (υπαπόντια): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μιζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του αισημένου σκουρών (*Autographa gamma*), του *Mythimna unipuncta*, της σποντόπτερας (*S. littoralis*), της πράσινης αφίδας (*Myzus persicae*), της αφίδας κολοκυνθοειδών (*Aphis gossypii*) και του Αλευρώδους (*Bemisia tabaci*) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δύση 125 κ.εκ./στρέμμα Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 Μεσοδιάτημα εφαρμογών: 14 ημέρες Όγκος ψεκ.: 100 λίτρα / στρέμμα Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθη, Καρπούζι, Κολοκύνθη (υπαπόντια): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μιζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του αισημένου σκουρών (*Autographa gamma*), του *Mythimna unipuncta*, της σποντόπτερας (*S. littoralis*), της πράσινης αφίδας (*Myzus persicae*), της αφίδας κολοκυνθοειδών (*Aphis gossypii*) και του Αλευρώδους (*Bemisia tabaci*) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δύση 125 κ.εκ./στρέμμα Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 Μεσοδιάτημα εφαρμογών: 14 ημέρες Όγκος ψεκ.: 100 λίτρα / στρέμμα Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθη, Καρπούζι, Κολοκύνθη (υπαπόντια): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μιζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του αισημένου σκουρών (*Autographa gamma*), του *Mythimna unipuncta*, της σποντόπτερας (*S. littoralis*), της πράσινης αφίδας (*Myzus persicae*), της αφίδας κολοκυνθοειδών (*Aphis gossypii*) και του Αλευρώδους (*Bemisia tabaci*) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δύση 125 κ.εκ./στρέμμα Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 Μεσοδιάτημα εφαρμογών: 14 ημέρες Όγκος ψεκ.: 100 λίτρα / στρέμμα Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθη, Καρπούζι, Κολοκύνθη (υπαπόντια): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μιζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του αισημένου σκουρών (*Autographa gamma*), του *Mythimna unipuncta*, της σποντόπτερας (*S. littoralis*), της πράσινης αφίδας (*Myzus persicae*), της αφίδας κολοκυνθοειδών (*Aphis gossypii*) και του Αλευρώδους (*Bemisia tabaci*) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δύση 125 κ.εκ./στρέμμα Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 Μεσοδιάτημα εφαρμογών: 14 ημέρες Όγκος ψεκ.: 100 λίτρα / στρέμμα Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθη, Καρπούζι, Κολοκύνθη (υπαπόντια): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μιζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του αισημένου σκουρών (*Autographa gamma*), του *Mythimna unipuncta*, της σποντόπτερας (*S. littoralis*), της πράσινης αφίδας (*Myzus persicae*), της αφίδας κολοκυνθοειδών (*Aphis gossypii*) και του Αλευρώδους (*Bemisia tabaci*) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δύση 125 κ.εκ./στρέμμα Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 Μεσοδιάτημα εφαρμογών: 14 ημέρες Όγκος ψεκ.: 100 λίτρα / στρέμμα Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθη, Καρπούζι, Κολοκύνθη (υπαπόντια): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μιζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του αισημένου σκουρών (*Autographa gamma*), του *Mythimna unipuncta*, της σποντόπτερας (*S. littoralis*), της πράσινης αφίδας (*Myzus persicae</i*