

Mancothane

80WP

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*): 200 γρ.σκ./στρ. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Τομάτα (Υπαίθρου): Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*): 200 γρ.σκ./στρ. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανά 7 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Πατάτα: Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*): 200 γρ.σκ./στρ. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7-10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 – 10 ημέρες εφόσον απαιτείται

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Για όλες τις καλλιέργειες 50-100.

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.
3. **Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του MANCOTHANE 80 WP.**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το MANCOTHANE 80WP πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) **28 ημέρες**, Τομάτα (Υπαίθρου) **3 ημέρες**, Πατάτα **7 ημέρες**.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: --

Συνθήκες αποθήκευσης – Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.



Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας:

Mancothane

80WP

Mancozeb (μανκοζέμπ)
Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη Σύνθεση:
Mancozeb: 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 5,88 % β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ. Ήρας 3, 19400 Κορωπί, Τηλ. 210 522 3834
Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
Παρασκευαστής: Indofil Industries Limited, Ινδία
Συσκευαστής: ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ, Μάνδρα Αττικής

GR01/2-12



SIPCAM



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Περιέχει mancozeb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.** Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ.**Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό. **Για το γιατρό:** Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δι-σουλφιδράμης. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. **ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού.