

MANCOZEB



MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- **Καλλιέργεια: ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), Στόχος:** Φουζήκλαιο (Venturia inaequalis, V. Pyrina), **Δόσεις σκευάσματος:** 200 g/στρέμμα (max), 150 – 200 g/100 lt ψεκ. υγρού, 50 – 100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφ' όσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προβλεπόμενων, Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες σε εναλλαγή με άλλα μυκητοκτόνα. Το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα αφορά στο συνδυασμό του προϊόντος με σκευάσματα που περιέχουν myclobutanil ή fenbuconazole, ενώ το μικρότερο στις απλές εφαρμογές. **Μεσοδιάστημα διαδοχικών εφαρμογών:** 14 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 4 εφαρμογές, εφ' όσον απαιτείται μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες, σε εναλλαγή με άλλα μυκητοκτόνα. Το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα αφορά στο συνδυασμό του προϊόντος με σκευάσματα που περιέχουν myclobutanil ή fenbuconazole, ενώ το μικρότερο στις απλές εφαρμογές. Μετάξύ διαδοχικών εφαρμογών του σκευάσματος, πρέπει να μεσολαβεί μεσοδιάστημα 14 ημερών.
- **Καλλιέργεια: ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιες & Οινοληψίσιμες ποικιλίες), Στόχος:** Περονόσπορος (Plasmopara viticola), **Δόσεις σκευάσματος:** 200 g/στρέμμα (max), 200 g/100 lt ψεκ. υγρού, 20 – 100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 4 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 10 ημερών, εφ' όσον απαιτείται.
- **Καλλιέργεια: ΚΑΡΟΤΟ, Στόχος:** Αλτερναρίωση (Alternaria dauci), **Δόσεις σκευάσματος:** 200 g/στρέμμα (max), 200 g/100 lt ψεκ. υγρού, 100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Εφαρμόζεται από το στάδιο του φυταρίου με ψεκασμούς που συνεχίζονται. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 4 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 14 ημερών, εφ' όσον απαιτείται.
- **Καλλιέργεια: ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ, ΑΣΚΑΛΩΝΙΑ (ΕΣΑΛΟΤ) (Υπαίθρου), Στόχος:** Σκουριάση (Ruscinia alli), **Δόσεις σκευάσματος:** 250 g/στρέμμα (max), 200-250 g/100 lt ψεκ. υγρού, 80 – 100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος από το 2^ο φύλλο, 2 και έπειτα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 4 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφ' όσον απαιτείται.
- **Καλλιέργεια: ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου), Στόχος:** Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani), **Δόσεις σκευάσματος:** 200 g/στρέμμα (max), 200 g/100 lt ψεκ. υγρού, 50 – 100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Προληπτικές εφαρμογές, εφ' όσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 3^{ου} πραγματικού φύλλου και έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Μεσοδιαστήματα ψεκασμών ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος, το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 5 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφ' όσον απαιτείται.
- **Καλλιέργεια: ΠΙΠΕΡΙΑ (Υπαίθρου), Στόχος:** Αλτερναρίωση (Alternaria solani), **Δόσεις σκευάσματος:** 200 g/στρέμμα (max), 200 g/100 lt ψεκ. υγρού, 50 – 100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Προληπτικές εφαρμογές, εφ' όσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από το στάδιο του 3^{ου} πραγματικού φύλλου και έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Μεσοδιαστήματα ψεκασμών ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος, το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 5 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφ' όσον απαιτείται.
- **Καλλιέργεια: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Κολοκύθα, Κολοκύθα, Πεπόνι (Υπαίθρου), Στόχος:** Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis), **Δόσεις σκευάσματος:** 200 g/στρέμμα (max), 200 g/100 lt ψεκ. υγρού, 100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο του 5^{ου} φύλλου και έπειτα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 4 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφ' όσον απαιτείται.
- **Καλλιέργεια: ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου), Στόχος:** Περονόσπορος (Brenzia lachrysa), **Δόσεις σκευάσματος:** 200 g/στρέμμα (max), 200 g/100 lt ψεκ. υγρού, 50 – 100 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Οι εφαρμογές ξεκινούν από το στάδιο των φυτάρων (BBCH 12) και συνεχίζονται. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 4 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφ' όσον απαιτείται.
- **Καλλιέργεια: ΠΑΤΑΤΑ, Στόχος:** Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani), **Δόσεις σκευάσματος:** 200 g/στρέμμα (max), 20-80 λίτρα/στρέμμα, **Τρόπος & Χρόνος Εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών. Εφαρμόστε το προστατευτικό από το φύτρωμα και έπειτα. Μεσοδιαστήματα εφαρμογών ανάλογα με την πίεση της ασθένειας. Αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει μετά από βροχή ή άρδευση, πριν εφαρμόσετε το σκεύασμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μέχρι 8 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφ' όσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το **MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP** είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλά κρίσιμα σημεία. Διαβέτι δε ευρύ φάσμα δράσης. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται αμέσως πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συστάσιμα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία.
- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
- Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελοφύλλα, σε περίπτωση χρήσης του σκευάσματος.

MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές (S13).
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε (S20/21).
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα (S24).
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία & γάντια (S36/37).
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα (S48).
- Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φορτώση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή.
- Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφ' όσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
- Κατά την εφαρμογή σε ανοιχτές, συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας (S61).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αφέραστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των λαχανικών και την καλλιέργεια της πατάτας, **10 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού και **30 μέτρων** για τις δενδροειδείς καλλιέργειες (SPe3).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.

- **Σε περίπτωση κατάποσης,** μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1 – 2 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
- **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε αμέσως τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμείνει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο ονάνεισμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το Mancozeb έχει δράση δισουλφιδρικής. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP

MANCOZEB (ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ) 80% ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Mancozeb : 80.00 % B/B
Βοηθητικές ουσίες : 13.20 % B/B

(Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα, του οίκου Dow AgroSciences, UK: 80% min)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ (S1/2)



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.&Τ. : 60.277/29.7.2010
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ –
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AGROTECHNICA OΒΕΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: DOW AGROSCIENCES, ΗΠΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: DOW AGROSCIENCES SAS, ΓΑΛΛΙΑ



Agrotechnica

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Θ. 1112 - 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265 - FAX: 2310 797 263
info@agrotechnica.gr - www.agrotechnica.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ



MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (R50)
ΜΗΝ ΣΥΓΚΛΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΤΟ ΤΡΩΓΩΝ
Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (S1)

- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**
- **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
- **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες της γλυκύδα: Κροκώτλη, Κόρη και Βολυβάστη. Μπορεί να προκαλέσει αναγωγή σε μηλιές ποικιλίας Golden Delicious.
- **ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν μπορεί να αναμειχθεί με σκευάσματα που συνδυάζονται με το σκευάστημα Insect E-W και Deltameth 5 SC.
- **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΜΗ (ημέρες):** Μηλιά (Μηλιά, Αχλαδιά): 28. Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοληψίσιμες ποικιλίες): 28. Καρότο: 30. Κρεμμύδι, Ασκαλώνια (Εσολή) (Υπαίθρου): 28. Τομάτα, Μελιτζάνα (Υπαίθρου): 3. Πιπέρι (Υπαίθρου): 3. Κολοκυθόειδα (Κολοκύθα, Κολοκύθα, Πεπόνι (Υπαίθρου)): 3. Μαρούλι (Υπαίθρου): 28. Πατάτα: 7.
- **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρότερο με εφελκυσμένο τρόπο δράσης.
- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΡΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:** Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιέργειες των μηλιών και του αμπελιού.
- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Καύση σε εγκατεμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάσει της μεμονωμένης νομοθεσίας. Τα κατά υλικά συσκευασίας, όπου κατασκευασμένα προηγουμένως με σκοπό, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
- **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάζετε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ, αναδεύστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε την διαδικασία. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με νερό, προσθέστε καθαριστικό με βάση την αμμωνία (συγκέντρωση 0,03%), αναδεύστε για 2 λεπτά και γεμίστε το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Αφήστε το για 15 λεπτά χωρίς ανάδευση και κατόπιν αδειάστε το δοχείο με πίεση μέσα από σωληνώσεις και βραχιόνες. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Φίλτρα και μηχανικά αρθρώματα να καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.
- **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε θερμοκρασία και κατά περιβάλλον, ξηρό χώρο, προστατευμένο από ακτίρες θερμοκρασίας και το άμεσο ηλιακό φως.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



131010

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: **500 γραμμ. (g)**

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: σουσευασία

ΚΟΠΤΙΚΟ
P 484C

P orange 021c

BLACK