

Pancop[®] 50 WP

Υδροξείδιο χαλκού
Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη Σύνθεση:
Μεταλλικός χαλκός 50% β/β,
σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού
Βοηθητικές ουσίες 12,74% β/β

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ**
επαφής με προστατευτική δράση.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60.130/14-09-2007



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, Ήρας 3, 194 00 Κορωπί, Τηλ. 210 522 3834
Τυποποιητής: AGRI-ESTRELLA, S. De R.L. de C.V., Μεξικό
Κάτοχος της έγκρισης και υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Παρασκευαστής: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Συσκευαστής: ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε.
Έξοδος 1, Παραπλεύρως Αττικής οδού, 196 00 Μάνδρα Αττικής

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αντίδοτο: Πενικιλλαμίνη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2. Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 4. Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, προσθέστε το στο ψεκαστικό και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 21 ημέρες - **ΑΚΡΟΔΡΥΑ:** 28 ημέρες - **ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Μη εφαρμοσίμο (Καθορίζεται από το στάδιο της ανάπτυξης κάθε εφαρμογής) - **ΑΜΠΕΛΙ:** 21 ημέρες - **ΕΛΙΑ:** 21 ημέρες - **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ+Θ):** 7 ημέρες - **ΤΟΜΑΤΑ:** Υπαίθρου: 10 ημέρες, Θερμοκηπίου: 21 ημέρες - **ΠΑΤΑΤΑ, ΑΡΑΧΙΔΑ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** 21 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμπελιού Delaware, Rosette, Niagara και Concord. Είναι φυτοτοξικό στα πυρηνόκαρπα μετά την έκπτυξη των φύλλων. Επαναλαμβανόμενες χρήσεις στα μηλοειδή μπορεί να προκαλέσουν καστανό χρωματισμό. Στην μηλιά οι εφαρμογές σταματούν όταν η πράσινη κορυφή είναι μήκους 1 εκ. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται στις χαμηλές θερμοκρασίες (<5 °C) και σε υγρές

συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα, όξινα και με σκευάσματα που περιέχουν thiram.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκκοι) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία <38 °C) και καλά αεριζόμενο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα υγρού	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ λίτρα /στρ.	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦ./ ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΠΕΡΙΟΔΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Παρασάβη - Λιμνο- νά - Μανταρινά - Γκρί- π φρουτ	Κορυμφοίριος, Ανθράκωσις, Σεπτορίωση, Προσβολή κλαδίσκων, φύλ- λων και καρπών Φυτόφθορος καρπών	100-160	200-250	3	Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάι ή παγετό. Το 2ο 15/10 μέχρι Οκτωβρίου και επανάληψη μετά 3-4 μήνες. Σύσταση ψεκασμός στα χαμηλά κλαδιά, μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος.
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά	Εξύσσος Κηλιδωσις φύλλων και καρπών	160	100-150	3	Στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των βλαστών οφθαλμών. Εφαρμογές που αρχίζουν μετά την πτώση των πετάλων και επαναλαμβάνονται κά- θε 15 έως 20 ημέρες.
Καρυδιά	Ανθράκωσις, Κηλιδωσις φύλλων και καρπών			4	Οι εφαρμογές αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες.
Φουντουκιά	Βακτηριακό έλκος			2	Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α. μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β. όταν πέσει το 75% των φύλλων.
Φιστίκια	Σεπτορίωση			4	Εφαρμογές α. στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β. όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά - Αχλαδιά	Φουζυλάδιο, Σεπτορίωση, Φαειά σήψη Βακτηριακή, Βακτηριακό κράμβο	240-250	100-200	3	Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσι- νης κορυφής. Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά την διάρκεια του χειμώνα.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερκοκιά	Κορίνιο, Φαειά σήψη	170	100-120	3	Στις περιοχές όπου οι ασθένειες ενδημούν, εφαρμογές α. το φθινόπωρο - μόλις πέ- σουν τα φύλλα και β. στο τέλος του χειμώνα πριν την δόγκωση των οφθαλμών. Εφαρμογές δόγκωσης των οφθαλμών και στη ροή της κορυφής.
Κερσιά	Κορίνιο			4	Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α. το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β. το χειμώνα πριν την δόγκωση των οφθαλμών.
Ροδιανά συμπε- ραβισμένα των Νεκταρινιών, Δαμασκηνά	Κορίνιο, Εξύσσος, Κηλιδωσις Φαειά σήψη Βακτηριακό έλκος			4	Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α. το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β. το χειμώνα πριν την δόγκωση των οφθαλμών. Εφαρμογές κατά δόγκωση των οφθαλμών. Στις περιοχές όπου οι ασθένειες ενδημούν, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
ΑΜΠΕΛΙ: (Για επιπρόσθε- τα αναφορικά στοιχεία)	Περνόντορος, Ανθράκωσις, Βακτηριακή νέκρωση	150-240	50-150	4	Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 μέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
ΕΛΙΑ	Κυκλοκόνιο Γλοισσπόριο, Καρκύνωση	260 (φθινόπωρο) 210 (άνοιξη) 260 260 (φθινόπωρο) 210 (άνοιξη)	150-300	2	Στις περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. Δύο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάι ή παγετό.
ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ) ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ)	Περνόντορος, Κλαδοσπορίωση, Σεπτορίωση, Ανθράκωσις, Βακτηριακές	250 (βραδύ προ- σβολή) 120-160 (εκαρά προσβολή)	50-100	4	Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανά 10 - 14 ημέρες. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανά- ληψη ανά 7 - 10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρπώδηση.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι, Καλαμπό- κι, Πεπόνι, Καρπούζι	Περνόντορος, Κλαδοσπορίωση, Ανθράκωσις, Βακτηρίαση	110	50-100	4	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανά- ληψη ανά 10 - 14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΦΑΣΟΛΙ	Κερκοσπορίωση, Βακτηριακές	140	50-80	3	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανά- ληψη ανά 7 - 14 ημέρες. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανά- ληψη ανά 10 - 14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΣΕΛΙΝΟ	Σεπτορίωση, Κερκοσπορίωση	140	50-80	3	Εφαρμογές όταν το φυτό έχει ύψος 15 - 20 εκ. και επανάληψη ανά 7 - 10 ημέρες ανάλογα της έντασης της προσβολής.
ΑΡΑΧΙΔΑ	Κερκοσπορίωση	180	60	3	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανά- ληψη ανά 7 - 10 ημέρες ανάλογα της έντασης της προσβολής.
ΠΑΤΑΤΑ	Περνόντορος, Ανθράκωσις	180 (βραδύ προ- σβολή) 110 (εκαρά προσβολή)	50-100	4	Εφαρμογές όταν το φυτό έχει ύψος 15 - 20 εκ. και επανάληψη ανά 10 - 14 ημέρες ανάλογα της έντασης της προσβολής.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ	Κερκοσπορίωση	250-280	40	4	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανά- ληψη ανά 10 - 14 ημέρες ανάλογα της έντασης της προσβολής.



SIPCAM