



gibberellic acid (γιββερελλικό οξύ) 400g/kg

Εγγυημένη σύνθεση: **gibberellic acid (GA3) 40,00 % β/β**
Βοηθητικές ουσίες 52,95 % β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8168/8-8-2006



ProGibb® is a registered trademark of Valent BioSciences Corporation, U.S.A.

Παρασκευαστής: Valent BioSciences Corporation, Η.Π.Α.

Τυποποιητής-Συσκευαστής: A-Z Drying, Η.Π.Α.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Philagro France, Γαλλία.



Υπεύθυνος επικοινωνίας: NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Υδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: 210 6889 700

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την επικέτα του προϊόντος, όπου είναι δυνατό. Σε περίπτωση εισπνοής απομακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση στο φάρμακο, κρατείστε τον σε ακινησία σε ζεστό περιβάλλον. Για λόγους ασφαλείας καλέστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλυνθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό, κρατώντας τα βλεφάρια ανοιχτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚ.:
ΑΡ. ΠΑΡΤ.:
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το ProGibb 40 SG είναι φυτορρυθμιστική ουσία, η οποία επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής, ανάλογα με την καλλιέργεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
- Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να έχει αναδευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΞΕΡΙΑΔΕΙΑ: Γκρέϊπ φρούτ. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής συνιστάται δόση 2,5-3,75 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό όταν οι καρποί στην περιφέρεια του δέντρου εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα κιτρινίσματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 200-400 λίτρα/στρέμμα. **Λεμονιά:** 1. Για συντόμωση του χρόνου συγκομιδής σε πολύφορες ποικιλίες 2. Για καθυστέρηση της συγκομιδής σε όλες τις ποικιλίες 3. Για αύξηση του μεγέθους του καρπού, συνιστάται δόση 1,25-2,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό όταν οι περισσότεροι καρποί έχουν χρώμα από βαθύ πράσινο έως ελαφρύ κίτρινο. Όγκος ψεκαστικού υγρού 200-300 λίτρα/στρέμμα. **Κλημεντίνες:** 1. Για αύξηση της καρπόδεσης και της παραγωγής σε δέντρα με χαμηλή παραγωγικότητα, συνιστάται δόση 2,5-6,25 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό, στην πλήρη άνθιση. 2. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής συνιστάται δόση 2,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό αφού συγκομισθούν οι καρποί, οι οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια του δέντρου και οι οποίοι ωριμάζουν νωρίς. Όγκος ψεκαστικού υγρού 200-300 λίτρα/στρέμμα. **Πορτοκαλιά:** (εκτός ποικιλίας Valencia): 1. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής. 2. Για βελτίωση της αντοχής του φλοιού του καρπού κατά την παραμονή στο δέντρο συνιστάται δόση 2,5γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό και για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται ψεκασμός μόλις το χρώμα του καρπού αρχίσει να αλλάζει από πράσινο σε κιτρινωπό. Εάν δεν επιδιώκετε μεγάλη καθυστέρηση της συγκομιδής, ψεκάστε αφού οι καρποί πάρουν το εμπορικό χρώμα τους. 3. Για τον περιορισμό των απωλειών που οφείλονται σε ρυτίδωση ή «φούσκωμα» του φλοιού κατά την εποχή της συγκομιδής συνιστάται δόση 2,5-5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό, 3-6 εβδομάδες πριν από την αλλαγή του χρώματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 300-400 λίτρα/στρέμμα.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: **Αχλαδιά:** 1. Για αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δεν δένουν ικανοποιητικά συνιστάται δόση 1,25 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό, στην αρχή της άνθησης. 2. Για ικανοποιητική καρπόδεση μετά την καταστροφή των ανθέων από παγετό (1) συνιστάται δόση 3,75-6,25 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό, στην αρχή της άνθησης. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. **Αμπέλι:** 1. Σουλτανίνα για επιτράπεζια χρήση. Για αύξηση του ποσοστού καρπόδεσης σε ποικιλίες που δεν δένουν συνιστάται δόση 5-10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό, στο διάστημα από την πλήρη άνθηση (όταν δηλαδή το 70% των πλιδιών έχει πέσει) και μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3mm (ακαγίου). (2) 2. Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας. Για αύξηση της παραγωγής και του μεγέθους της ράγας, όταν είναι μικρότερο του κανονικού συνιστάται δόση 0,5-2 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό, κατά το δέσιμο και όταν οι ράγες έχουν αποκτήσει μέγεθος 3mm (ακαγίου). 3. Μαύρη Κορινθιακή (σταφίδα). Για βελτίωση της ποιότητας και αποφυγή του σχισμού των ραγών συνιστάται προσεκτικός ψεκασμός με δόση 0,25-1,25γρ. σκευάσματος/100 λίτρα νερό όταν έχουν πέσει όλα τα πλιδία. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: **Αγκινάρα:** Για πρόωξη της αγκινάρας, για βελτίωση της ποιότητας και για αύξηση της παραγωγής συνιστάται δόση 0,625-1,25 γρ. σε 15 λίτρα νερό, όταν εμφανιστούν 6-8 φύλλα ή 8-12 φύλλα για φυτά ενός έτους. (3). Όγκος ψεκαστικού υγρού 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Πατάτα:** Για προβλάστηση του πατατόσπορου και για αύξηση της παραγωγής συνιστάται δόση 2,5 γρ. σε 600 λίτρα νερό, με βύθισμα των κονδυλίων είτε κομμένων είτε όχι για 4 λεπτά σε διάλυμα του σκευάσματος.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος:

Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή: 1, Πατάτα: 1, Αμπέλι (Για σουλτανίνα για επιτράπεζια χρήση): 2, (Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας): 1, (Μαύρη Κορινθιακή (σταφίδα)): 1, Αγκινάρα: 3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται με προσθήκη προσκολλητικού σε όλες τις καλλιέργειες εκτός από τα λαχανικά. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως του προσκολλητικού.

- (1) Πρέπει να προσέξετε ώστε να μη συμβεί υπερβολική καρπόδεση.
- (2) Προσέξτε ώστε αν βραχύνουν καλά τα ταμπιά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε δύο φορές: α) όταν το 70% των πλιδιών έχουν πέσει (στην πλήρη άνθηση) και β) κατά την καρπόδεση, δηλαδή 5-12 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό, ανάλογα με τις οκολογικές συνθήκες της περιοχής.
- (3) Συνιστώνται 3 συνολικά ψεκασμοί σε διαστήματα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Πρέπει να αυξηθεί συγχρόνως η λίπανση κατά 30% και να εξασφαλιστεί η επαρκής άρδευση. Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για άρδευση. Εάν το νερό άρδευσης είναι αλατούχο, πρέπει να αποφεύγεται η πολύ πρόωξη χρήση του σκευάσματος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα ψεκαστικά διαλύματα αλλά δεν πρέπει να συνδυάζεται με αλκαλικής αντίδρασης ψεκαστικά υγρά (άσβεστος, θείο κ.λπ.)

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας. Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργείας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική και κλειστή συσκευασία του σε δροσερό ξηρό, αεριζόμενο μέρος και σε θερμοκρασία πάνω από 0°C και κάτω από 32°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας και ανάφλεξης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.

DESCRIPTION	ProGibb 40 WSG
	Leaflet 2,5 g
SIZE	15,8 x 21,7 cm
MIN POINT SIZE	6
COLORS	BLACK
	PMS 348 C
	PMS 185 C
	PMS 151 C
DATE	31.03.2009
VERSION	5

COLOR SEPARATIONS
PANTONE 298 C
PANTONE 151 C
PANTONE 185 C
PANTONE 348 C
BLACK