

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δείκτο δεδομένων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
• Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικινδύνη ζώνη σε καθαρό αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό. • Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό, καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα
• Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Αν μολυνθούν τα νερά αρδευσεως να μην χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. • Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 ατμ. (45 psi). • Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. • Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με νερό.

Φυτοτοξικότητα:
Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα:
Το TOPIK 240 EC συνδυάζεται με όλα τα ηλιαυφυλλοκτόνα σιταριού, πλην εκείνων που περιέχουν εστέρες την 2,4-D. Επιπλέον, συνδυάζεται και με όλα τα συνήθως χρησιμοποιούμενα μυκητοκτόνα σιτηρών χωρίς πρόβλημα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Σιτάρι (σκληρό, μαλακό). Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του.



© Σήμα κατατεθέν της Syngenta

Αριθμ. πιστοποίησης: Βλέπε φιάλη
Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη
Ημ. λήξης: Βλέπε φιάλη

L126830 GREC/12J



Clodinafop-propargyl
(κλινοναφόπ-προπαρζύλ)
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Clodinafop-propargyl 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76,76% β/β
(περιέχει ως αντιφυτοτοξικό παράγοντα cloquintocet-mexyl 6% β/ο)

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 7756/30.9.05
Λήξη εγκρ. Κυκλ.: 31.12.09

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Syngenta Crop Protection AG, Γερμανία
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ.Ανθούσης, 153 49 Ανθούσα, Αττική, Τηλ.: 210 666612-13
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σινδός, Τηλ.: 231 0796940-3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Οινόφυτα, Βοιωτία

Product name marked @ or ®, the SYNGENTA Logo and the OP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 λίτρο e



Φόσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜ./ΚΑΛΙΕΡΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ
		Κ.ΕΚ. σκευάσμ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρ./στρ.		
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)	Άλοπονούρα (Alopecurus spp.)	17	20 - 30	Από το 3ο φύλλο της καλλιέργειας μέχρι το τέλος του αδελέφωματος	1
	Αγριοβρώμη (Avena spp.)	17			
	Φάληρα (Phalaris spp.)	20			
	Ήρες (Lolium spp.)	27			
	Μίλιο (Milium vermale)	20			

Παρατηρήσεις:

1. Συνιστάται εφαρμογή για αποφυγή ζημιών στο σιτάρι τόσο από το τρακτέρ όσο και από τα ζιζάνια να γίνεται όσο πιο ενωρίς είναι δυνατόν.
2. Ανθεκτικά ζιζάνια: • Bromus spp. (βρώμος), • Poa annua (κοινή πόα), • Hordeum murinum (αγριοκρίθαρο).

Τρόπος δράσης:

Καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων (Avena spp., Alopecurus spp., Phalaris spp., Milium vermale, Lolium spp.) στην καλλιέργεια σιταριού (μαλακού και σκληρού). Απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών.

Τρόπος εφαρμογής:

Μεταφυτρωτικό ψεκασμός. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-30 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/2 με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο ανάδευσης. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Ψεκάσουμε υπό συνεχή ανάδευση εντός ορίγων ωρών.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καθαρό αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία από 0 έως 35°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.