

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. • Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του. Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Να αποφεύγεται παρατεταμένη ή συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα διότι μπορεί να προκληθεί ερεθισμός. Εάν το προϊόν πέσει με μεγάλη πίεση στο δέρμα, μπορεί να εισχωρήσει μέσα στους ιστούς. Στη περίπτωση αυτή να ζητηθεί ιατρική εξέταση ακόμη και αν δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα. Σε περίπτωση εισπνοής: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Κρατείστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του στόματος και της αναπνευστικής οδού.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 21 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες. Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε την "τελευταία επέμβαση" του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 21 ημέρες). Στο αμπέλι και ακτινίδια είναι μη εφαρμόσιμο, εφαρμογή στο στάδιο του ληθάργου.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε μερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1-2 φυτά.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα συνδυάζεται με όλα τα γνωστά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, Propargite, Captan, Dinocap.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απαρτία συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από εστίες θέρμανσης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας:



Treenol®

97 EC

Παραφινικό ορυκτέλαιο
Υγρό Γαλακτωματοποίηση (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση:
paraffin mineral oil 96.3% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 3.7% β/β

Θερινός πολτός, για την καταπολέμηση
κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και
λεπιδοπτέρων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

• Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους
πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Αριθ. Πρωτ. ΥΑΑΤ: 185169/31-05-2010

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα: OXON ITALIA SpA, Ιταλία

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ,
Ήρας 3, 194 00 Κορωπί, Τηλ. 210 522 3834
Παρασκευαστής: TOTAL Fluides, Γαλλία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



SIPCAM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπέκ τύπου σκούπας σε:

A. ΑΜΠΕΛΙ – ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: Χειμερινά αυτά του κόκκινου τετράνυχου. Συνιστάται ένας ψεκασμός τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη διόγκωσης των σφαλαμών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50 λίτρα/ στρέμμα και δόση 1000 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.

B. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Γκρέιπ φρούτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, φράπα): Κόκκινη ψώρα. Ψευδόκοκκος. Λεκάριο. Ασπρη ψώρα. Μαύρη ψώρα. Άλλα κοκκοειδή. Τετράνυχος. Αλευρώδεις.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: (Μηλιά, σχλαδιά): Ψώρα Σαν Ζοζέ. Παρλατόρια. Βαμβακάδα. Μυτιλόμορφη ψώρα. Σταχτιά ψώρα. Φυλλοδέτες. Τετράνυχος. Ψύλλα. Αφίδες.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηλιά) - **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** Ψώρα Σαν Ζοζέ. Βαμβακάδα. Σφαιρολεκάριο. Παρλατόρια. Μυτιλόμορφη ψώρα. Αφίδες, Φυλλοδέτες, Ακάρεα. Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων

ΕΛΙΑ: Λεκάριο. Ασπιδιώτης. Παρλατόρια. Πολίνια. Μυτιλόμορφη ψώρα. Βαμβακάδα. Προνύμφες εντόμων.

ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Κοκκοειδή. Φυλλορύκτες. Φυλλοδέτες. Αφίδες.

Εποχή εφαρμογής: Μπορεί να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: - Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης). - Καλοκαίριου. - Φθινοπώρου. - Χειμώνα. Για τα εσπεριδοειδή η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα (Φεβρουάριο - Μάρτιο).

Δοσολογία: 1000-1300 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό όταν εφαρμόζεται μόνο του ή 500 κ.εκ σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Εσπεριδοειδή 200-400, Μηλοειδή - Πυρηνόκαρπα: 150-250. Αμυγδαλιά 100-200. Ελιά 150-300. Καλλωπιστικά 80.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι - Ακτινιδιά 1. Λοιπές καλλιέργειες 4.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος: - Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση - Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. - Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. - Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. - Σε περίπτωση που το αναμειγνύουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του **TREENOL 97EC** τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφεύγεται τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων, carbaryl σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας
8. Να μην χρησιμοποιείται μαζί με carbaryl στα σπιρτοφόρα δένδρα.