



DuPont™ Vydate® 10GR

Νηματοδοκτόνο

Καθ. Βάρος: 10 κιλά

Oxamyl 100 g/kg

ΚΟΚΚΩΔΕΣ (GR)

Εγγυημένη σύνθεση: **Oxamyl** 10 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,9 % β/β



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματοδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

**ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.
 ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ.**

**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
 ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
 3.053/4-10-2013

Παρασκευαστής: **DuPont International Operations Sàrl**


Τυποποιητής και συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Γαλλία

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά - Διανομέας:
NTY PONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
 Τηλ: 210 688 9700

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

K-34400/31405 (FRONT) - GREECE



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο
- Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη
- Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά τη χρήση.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε πρώτες βοήθειες στην ετικέτα).
- Ξεπλύνετε το στόμα.
- Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση και τα μολυσμένα αντικείμενα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν είναι αναγκαίο, χορηγήστε οξυγόνο ή εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε 2 ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό **μόνον** εάν το άτομο έχει τις αισθήσεις του. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε αναισθητό άτομο. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλύντε αμέσως με άφθονο νερό τη δερματική περιοχή στην οποία έπεσε σκεύασμα, επί 15 λεπτά. Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και παπούτσια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θεϊκή Ατροπίνη.

Αν εμφανιστούν προειδοποιητικά συμπτώματα, να χορηγηθούν αμέσως σε λίγο νερό, 2 αμπούλες θεϊκής ατροπίνης του 0.5 mg και μετά, 1 αμπούλα κάθε 10-15 λεπτά μέχρι να στεγνώσει ο λαιμός και το δέρμα να γίνει στεγνό και κοκκινωπό. Να συνεχιστεί με όσες αμπούλες χρειάζονται για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση ώσπου να φθάσει ο γιατρός.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ:

Προειδοποιητικά συμπτώματα: Η δηλητηρίαση από oxamyl προκαλεί συμπτώματα αναστολής της χοληνεστεράσης (αδυναμία, ιδρώτα τάση λυποθυμίας, θαμνή όραση, κεφαλόπονο, κλείσιμο της κόρης, αργό σφυγμό, αναούλα, εμετό, βάρος στο στήθος, κοιλιακές συσπάσεις, τρεμούλα).

Θεραπευτική αγωγή: Διατηρείστε πλήρη ατροπονισμό με 1,2-2 mg θεϊκή ατροπίνη ενδοφλεβίως κάθε 10-30 λεπτά μέχρι ο παθόντας να αναλάβει. Ισως χρειαστεί και τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο.

Αποκλείστε έκθεσή του σε οποιοδήποτε άλλο αναστολέα της χοληνεστεράσης μέχρι να γίνει τελείως καλά. Μη χρησιμοποιείτε Μορφίνη ή 2-PAM.

ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό καρβαμικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου). Δρα στο νευρικό σύστημα λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή στο έδαφος: Πριν τη φύτευση ή κατά τη φύτευση/μεταφύτευση με χρήση μηχανικών μέσων που συνδέονται με τρακτέρ. Μετά την εφαρμογή οι κόκκοι πρέπει να ενσωματώνονται στο έδαφος σε βάθος έως 10 εκ.

Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής: Πλύνετε σχολαστικά τον εξοπλισμό εφαρμογής χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Ο καθαρισμός να μην πραγματοποιείται σε κλειστούς χώρους, κοντά σε πηγάδια, υδάτινες ρεύματα/επιφάνειες, δένδρα ή καλλιεργήσιμα εδάφη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**Πατάτα - Πρώιμη πατάτα:**

Για την καταπολέμηση νηματωδών: *Heterodera* sp., *Globotera* sp. συνιστάται μία εφαρμογή με σκόρπισμα σ' ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ. στη δόση 4-5,5 κιλά/στρέμμα.

Καπνός:

Για την καταπολέμηση νηματωδών: *Meloidogyne* sp. και *Meloidogyne incognita* συνιστάται μία εφαρμογή με σκόρπισμα σ' ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ. στη δόση 4,25-5,5 κιλά/στρέμμα ή μία εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι στη δόση 3 κιλά/στρέμμα.

Καρότο:

Για την καταπολέμηση νηματωδών: *Meloidogyne* sp. συνιστάται μία εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι κατά τη μεταφύτευση στη δόση 2,5 κιλά/στρέμμα.

Τομάτα, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου και υπαίθρου με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό):

Για την καταπολέμηση νηματωδών: *Meloidogyne* sp. συνιστάται μία εφαρμογή με σκόρπισμα σ' ολόκληρη την επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ. στη δόση 4,5-5,5 κιλά/στρέμμα ή μία εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι στη δόση 3 κιλά/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

- 1) Η ομοιόμορφη κατανομή των κόκκων στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους έως 10 εκ. είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου των νηματωδών.
- 2) Οι μεγαλύτερες δόσεις του εύρους να χρησιμοποιούνται σε βαριά εδάφη ή σε περιπτώσεις βαριάς προσβολής
- 3) Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/έτος: 1

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά νερά.

Για να προστατέψετε τα πουλιά και τα άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

Για να προστατέψετε τα πουλιά και τα άγρια ζώα, μαζέψτε όσο προϊόν έχει διασκορπιστεί κατά λάθος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 120 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος στο έδαφος.

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας

1. Να γίνεται κατάλληλη εναλλαγή καλλιεργειών.
2. Ο εξοπλισμός εφαρμογής να είναι σωστά βαθμονομημένος ώστε να διασφαλίζεται η σωστή δοσολογία.
3. Να χρησιμοποιούνται κατάλληλες ποικιλίες σε σχέση με την ευαισθησία τους στους νηματωδείς.
4. Να γίνεται εναλλαγή με νηματωδοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Να μην εφαρμόζεται με το χέρι αλλά με μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων (μηχανικά μέσα που συνδέονται με τρακτέρ).
- Ο χρήστης κατά το άνοιγμα των συσκευασιών και το γέμισμα του εξοπλισμού εφαρμογής να φοράει γάντια νιτρίλου και να μην εφαρμόζει το σκεύασμα σε έκταση μεγαλύτερη από 50 στρ/ανά ημέρα.
- Να μην υπερβαίνεται η δοσολογία που αναφέρεται στο φάσμα δράσης στην ίδια καλλιέργεια/χωράφι το χρόνο με αυτό ή άλλο προϊόν που έχει oxamyl.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Πατάτα πρώιμη: 84 ημέρες
- Καρότο: 75 ημέρες
- Λοιπές καλλιέργειες: μη εφαρμόσιμο

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα.



ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:
ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ