



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου). Δρα στο νευρικό σύστημα λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με στάγδην άρδευση. Το σκεύασμα διοχετεύεται στο νερό άρδευσης και διανέμεται στο έδαφος μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης. Συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται όταν το έδαφος έχει φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο υγρασίας φροντίζοντας να υπολείπονται 2-3 λεπτά άρδευσης με καθαρό νερό ώστε να καθαρίζεται το σύστημα άρδευσης. Το σύστημα άρδευσης να είναι σωστά βαθμονομημένο ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση προϊόντος και συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο βυτίο εφαρμογής και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τομάτα, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου και υπαίθρου με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό):

Για την καταπολέμηση του νηματώδους: *Meloidogyne* spp. συνιστώνται: Στάγδην άρδευση: στη μεταφύτευση μία εφαρμογή σε δόση 1-2 λίτρα/στρέμμα και ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) με τελευταία εφαρμογή έως 42 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, 1-3 εφαρμογές σε δόση 1 λίτρο/στρέμμα με μεσοδιαστήματα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Πιπεριά (θερμοκηπίου και υπαίθρου με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό):

Για την καταπολέμηση του νηματώδους: *Meloidogyne* spp. συνιστώνται: Στάγδην άρδευση: στη μεταφύτευση μία εφαρμογή σε δόση 1-2 λίτρα/στρέμμα και ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) με τελευταία εφαρμογή έως 28 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, 1-2 εφαρμογές σε δόση 1 λίτρο/στρέμμα με μεσοδιαστήματα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Αγγούρι (θερμοκηπίου και υπαίθρου με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό):

Για την καταπολέμηση του νηματώδους: *Meloidogyne* spp. συνιστώνται: Στάγδην άρδευση: στη μεταφύτευση μία εφαρμογή σε δόση 1-2 λίτρα/στρέμμα και ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) 1 εφαρμογή σε δόση 1 λίτρο/στρέμμα.

Πεπόνι, Καρπούζι (θερμοκηπίου και υπαίθρου με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό):

Για την καταπολέμηση του νηματώδους: *Meloidogyne* spp. συνιστώνται: Στάγδην άρδευση: κατά τη μεταφύτευση μία εφαρμογή σε δόση 1-2 λίτρα/στρέμμα και ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) 1 εφαρμογή σε δόση 1 λίτρο/στρέμμα.

Μπανάνα (αγρού):

Για την καταπολέμηση των νηματωδών: *Meloidogyne* spp. και *Pratylenchus* spp. συνιστώνται: Στάγδην άρδευση: 1-3 εφαρμογές σε δόση 1 λίτρο/στρέμμα έως το 50% των τσαμπιών να φτάσει το μέγιστο πάχος των φρούτων.