



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

ENTOMOKTONO

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ: BELAZ 2,5 EC

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 2,5 % β/ο δραστική ουσία (deltamethrin) και 97.19 % β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της άδειας: Agriphar S.A.

Υπεύθυνος για τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου (Υ)= Υπαίθρου, (Θ)= Θερμοκηπίου.

Πεδίο εφαρμογής – Στόχοι – Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νερατζιά): i) Αφίδες (*Myzus persicae*) με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (30-50) κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Λεκάνιο (*Saissetia oleae*), Μύγα της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50) κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Ακρόδυνα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά): i) Αφίδες (*Hyalopterus spp.*) με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (42-50) κ.εκ. σκευ. σε 140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Καρπόκαφα καρυδιάς (*Laspeyresia pomonella*), Καρπόκαφα καστανιάς (*Laspeyresia splendana*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (42-50) κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. iii) Ευρύτομο (*Eurytoma plotnicovi*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50) κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά): i) Καρπόκαφα της μηλιάς (*Laspeyresia pomonella*), Αφίδες (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*), Ψύλλα της μηλιάς (*Psylla mali*) με 30-50* κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (30-50) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orama*, *Archips rosanus*) με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (35-50) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Ψύλλα αχλαδιάς (*Psylla pyri*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50) κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά): i) Φυλλοδέτες (*Adoxophyes orana*, *Archips rosanus*), Ανάρσια (*Anarsia lineatella*) με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (35-49) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Ραγολέτιδα (*Rhagoletis cerasi*) με 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (40-70) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Μύγα της μεσογείου (*Ceratitis capitata*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50-70) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Αφίδες (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Hyalopterus pruni*), Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς (*Laspeyresia funebrana*) με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (30-70) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Αμπέλι:** i) Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*) με 50 κ.εκ. σκευ.(1^η γενεά) & 50-70 κ.εκ. σκευ. (2^η και 3^η γενεά)/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50-70) κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κογχυλίδα (*Clysia ambiguella*) με 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50-70) κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Τζιτζικάκια (*Empoasca spp.*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50) κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Φράουλα (Υ+Θ): Αφίδες (*Aphis spp.*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (25-50) κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Ελιά: i) Δάκος (*Bactrocera oleae*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50-70) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες, ii) Λεκάνιο (*Saissetia oleae*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50-70) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Βαμβακάδα (*Euphyllura spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (30-70) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών, iv) Πυρηνοτρύτης (*Prays oleae*) με 30 κ.εκ. (ανθοβ.) ή 50 κ.εκ. (καρποβ.) σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (30-70) κ.εκ. σκευ. σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες.

Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο: Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Σολανώδη (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα) (Υ), Πιπεριά (Θ): i) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactucae*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (30-50) (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και (30-70) (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσα (*Nezara viridula*) με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (18-30) (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και (18-42) (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδης (*Trialeurodes vaporariorum*) με 70 (Θ) κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (42-70) (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iv) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.

Σολανώδη (Τομάτα, Μελιτζάνα) (Θ): i) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*), Αφίδες (*Myzus*

persicae, *Aphis gossypii*, *Anuraphis cardui*, *Hyperomyzus lactuae*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (30-50) (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Βρωμούσα (*Nezara viridula*) με 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (18-42) (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.

Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι) (Υ+Θ): i) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Αφίδες (*Aphis spp.*, *Hyperomyzus lactuae*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (30-50) (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα και (30-70) (Θ) κ.εκ. σκευ. σε 60-140 (Θ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 (Υ) κ.εκ. σκευ. σε 60-100 (Υ) λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.

Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο: i) Πιερίδα (*Pieris spp.*), Μαμέστρα (*Mamestra brassicae*), Πλούζια (*Plusia gamma*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Brevicoryne brassicae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ.σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Πλουτέλλα (*Plutella xylostella*) με 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Μαρούλι (Υ): i) Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exiqua*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*), Αφίδες (*Hyperomyzus lactuae*, *Aphis spp.*, *Nasonovia ribis-nigri*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (25-50) κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.

Σπανάκι: i) Αφίδες (*Aphis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exiqua*), Μαμέστρα (*Mamestra spp.*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (35) κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με (35) κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι: i) Αφίδες (*Aphis spp.*), Σποντόπτερα (*Spodoptera exiqua*), Μαμέστρα (*Mamestra spp.*), Άλτης (*Chrysodeixis chalcites*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (35) κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Ψυχανθή (Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια): Πράσινο ακουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis spp.*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Μπιζέλια: i) Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σιτόνα (*Sitona spp.*) με 25 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αφίδα των κουκιών (*Aphis fabae*), Κάμπια των μπιζελιών (*Laspeyresia nigricana*), Θρίπας (*Thrips angusticeps*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Αγκινάρα: i) Κασσίδα (*Cassida spp.*) με 50 κ.εκ. σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Προντένια (*Spodoptera litura*), Αφίδες (*Anuraphis cardui*, *Myzus persicae*) με 30-50 κ.εκ.

σκευ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.

Πατάτα: i) Δορυφόρος (*Leptinotarsa decemlineata*) με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Σποντόπτερα (*Spodoptera littoralis*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Βαμβάκι: i) Ρόδινο σκουλήκι (*Pectinophora gossypiella*), Πράσινο σκουλήκι (*Helicoverpa armigera*) με 50-70 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Αλευρώδης (*Bemisia tabaci*), Τζιτζικάκια (*Empoasca spp*) με 50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Αφίδες (*Aphis spp.*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 30-50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Καπνός: Θρίπας (*Thrips tabaci*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.

Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι: i) Αφίδες (*Aphis fabae*, *Myzus persicae*), Μύγα των τεύτλων (*Pegomya spp*), Άλτης (*Chaetocnema tibialis*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Κασσίδα (*Cassida nebulosa*) 50 κ.εκ. σκευ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Αραβόσιτος*:** i) Πυραλίδα (*Ostrinia nubilalis*), Σεζάμια (*Sesamia nonagrioides*), Πράσινο ακουλήκι (*Helicoverpa armigera*), Σποντόπτερα (*Spodoptera spp.*), Αφίδες (*Rhopalisiphum padi*, *Sitobion avenae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών. ii) *Diabrotica virgifera* με 50 κ.εκ. σκευ. σε 60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών.

Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): Αφίδες (*Rhopalisiphum padi*, *Sitobion avenae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis spp.*) με 30-50 κ.εκ. σκευ. σε 40-60 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Μηδική: Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σκαθάρι των μπιζελιών (*Apion pisi*), Φυτονόμος (*Hypera postica*) με 25 κ.εκ. σκευ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.

Καλλωπιστικά (Υ+Θ): i) Αφίδες (*Myzus spp.*), Θρίπες (*Thrips tabaci*) με 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (25-50) κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, ii) Φυλλοδέτες (*Archips spp.*, *Adoxophyes spp.*, *Pandemis spp.*) με 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (17,5-35) κ.εκ. σκευ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα, iii) Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*) με 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (50) κ.εκ. σκευ. σε 70 λίτρα ψεκ. υγρού στο στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):

Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά: 1/30. Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά: 2/30. Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά: 2/7. Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά: 1/7. Αμπέλι: 3/7. Φράουλα (Υ+Θ): 3/3. Ελιά: 1/7. Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο: 3/7. Τομάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα

(Υ): 3/3. Πιπεριά (Θ): 4/3. Τομάτα-Μελιτζάνα (Θ): 4/3. Αγγούρι-Αγγουράκι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι (Υ+Θ): 3/3. Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο: 2/7. Μαρούλι (Υ): 3/3. Σπανάκι: 2/3. Μαϊντανός, Σέλινοι, Ρόκα, Αντίδι: 2/3. Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια: 2/7. Μπιζέλια: 2/7. Αγκινάρα: 3/3. Πατάτα: 3/7. Βαμβάκι: 2/30. Καπνός: 3/7. Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Παντζάρι: 1/30. Αραβόσιτος: 3/30. Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 1/- . Μηδική: 2/14. Καλλωπιστικά (Υ+Θ): 3/-.

Παρατηρήσεις:

***ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50κ.εκ. σκευάσματος /hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. **Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.**

******Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

*******Η εφαρμογή του BELAZ 2,5 EC στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp. στη περίπτωση που η προσβολή αυτή υπάρχει.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:

α) Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. β) Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. γ) Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. δ) Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με BELAZ 2,5 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. ε) Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, **ειδικό σύστημα μικροδοκιμής**, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. ζ) Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.