

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δείκτη δεδομένου ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, και δείξτε αμέσως το δοχείο, την ετικέτα ή το MSDS (Δείκτη δεδομένων ασφαλείας). Να μην προκληθεί εμετός.

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα μολυσμένα ρούχα πρέπει να πλυθούν πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Εάν η πλήση στομάχου κρίνεται απαραίτητη να αποφευχθεί η αναρρόφηση των γαστρικών υγρών. Να κριθεί εάν χρειάζεται η χορήγηση ενεργού ξυλάνθρακα και καθαρισμού.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζωή προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων.

Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιεργείες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από 5 μέτρα από γειτονικές καλλιεργείες ή φυτά.

Τρόπος δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καρβοεινιδίων με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση 2-3 Atm υπό συνεχή ανάδευση, με τα συνήθη ψεκαστικά, με 25-30 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα με μικτό τύπου σκόπας. Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εφαρμογή. Συνιστάται η χρησιμοποίηση του μικρότερου όγκου νερού και στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο (όταν τα ζιζάνια θα έχουν αναπτυχθεί) να χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος νερού.

Συνδυαστικότητα: Για διεύρυνση του φάσματος των καταπολεμούμενων ζιζανίων και ιδιαίτερα για την ταυτόχρονη καταπολέμηση και αγρωστωδών ζιζανίων το σκεύασμα μπορεί να συνδυασθεί με Milagro 4 SC ή με Rush 25 WG στις συνιστώμενες αντίστοιχες δόσεις.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Τα κενά συσκευασίας ξηλώνετε τα πολλές φορές ριχνώντας το νερό στο ψεκαστικό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μέσων: Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξηλώνετε το εσωτερικό του βυτίου με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της περιεκτικότητας του. Βάλτε το ψεκαστικό σε λειτουργία. Αφού το αδιάσπειρα επαναλάβετε τη διαδικασία. Ψεκάστε το νερό του καθαρισμού σε ακαθίστητο έδαφος μακριά από υδάτινες επιφάνειες.

L157569 GREC/3P



Callisto[®]
10 SC

syngenta.

Mesotrione (μεζοτρίον)
(χημική ομάδα δρώντος τρικετονές)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυβλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 7732/27-7-2004
Ημ. Λήξης Έγκρ. Κυβλ.: 30-09-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Mesotrione 10% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 90, 12% β/β

**Μεταφυτρωτικό εκλίκτικο
ζιζανιοκτόνο για την
καταπολέμηση ετησίων
πλητυφύλλων ζιζανίων
στον αραβόσιτο.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Μόνο για επαγγελματική χρήση

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Syngenta Agro SAS, Aigues-Vives, Γαλλία

Product name: Mesotrione 10 SC. The ALLIANCE FF logo is the Syngenta logo and the PESTICIDE FORUM are trademarks of Syngenta Inc. or Syngenta Group Company.

1 lt e

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Ερεθιστικό για τα μάτια.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φάσμα δράσης:

Καθιέρωση	Ζιζάνια (Ετήσια πλατυφύλλα)	Δόση εφαρμογής (σκέυασμα)	Στάδιο εφαρμογής
Αραβόσιτος	Αγριοβαμβάκι (Abutilon theophrasti) Αγριοτοματιά (Solanum nigrum)	75 κ.εκ./στρ.	Μία εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι τα 6 φύλλα του ζιζανίου.
	Βλήτο (Amaranthus spp) Τάτοϋλας (Datura stramonium) Αγριομελίτζάνα (Xanthium strumarium) Λουβουδιά (Chenopodium album)	75 κ.εκ./στρ.	Μία εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι τα 4 φύλλα του ζιζανίου.

Παρατηρήσεις: Σε υψηλότερες δόσεις (μέχρι 150 κ.εκ. σκευ./στρ.) περιορίζει την ανάπτυξη ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων και κύπερης.

Προσοχή:

1. Σε περίπτωση αποτυχίας της καθιέρωσης στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος την ίδια καθιέρωτική περίοδο.

2. Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρουν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη πλιάνος, σφύο προηγμένη δόση άροση.

3. Να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και χαλαρότευτλα, πατζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

4. Πρόσβαση των ζώων μετά από 12 ημέρες.

Διακρίση ανθεκτικότητας: Όταν υπάρχει συνεχόμενη καθιέρωση αραβόσιτου, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του Callisto για περισσότερες από 2 συνεχόμενες καθιέρωτικές περιόδους. Συνιστάται η εναλλαγή του με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης καθώς και η εναλλαγή των καθιέρωσιών.

Φυτοτοξικότητα: Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου. Πιθανή εμφάνιση λεύκανσης των φύλλων του καλαμπόκιου υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών. Ξηρασία ή έντονη μεταβολή της θερμοκρασίας. Είναι παροδικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας:

Αποτέφωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποτέφωση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις σε θερμοκρασία ανώτερη των 1200°C όπου ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας της αέριας φάσης θα πρέπει να είναι 2 δευτερόλεπτα.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το Callisto παραμένει σταθερό για 2 χρόνια υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, στην αρχική κλειστή συσκευασία. Να φυλάσσεται από το κρύο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:---



Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φάση
Ημ/νία Παραγωγής: Βλέπε φάση