



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ:

CAZA 2.15 Gel bait

Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για το έλεγχο των κατσαρίδων από επαγγελματίες χρήστες. **Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.**

Ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή gel (Gel bait) με 2.15% β/β δραστική ουσία (Imidacloprid), 97.78% β/β βιοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της έγκρισης: SHARDA EUROPE B.V.A.

Διανομή: FARMA-CHEM S.A.

Σταθερότητα στην αποθήκευση:

Διατηρούμενο στους $0\pm1^{\circ}\text{C}$ για 7 ημέρες δεν παρατηρείται αλλοίωση. Διατηρούμενο στους $54\pm2^{\circ}\text{C}$ για 14 ημέρες, δεν παρατηρείται αλλοίωση. Συνίσταται να διατηρείται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες. Διατηρείται για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον εφόσον φυλάσσεται στις ως άνω συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

Σταθερότητα:

- στον αέρα:** Σε κλειστή ή ανοιγόμενη για 1-2 ημέρες και επανακλειόμενη συσκευασία, παραμένει σταθερό για 5 χρόνια.
- στο φως:** Σταθερό σε κλειστή συσκευασία για τουλάχιστον 5 χρόνια.
- στο νερό:** Αδιάλυτο νερό.
- σε διάφορα pH:** Δεν εφαρμόζεται.
- σε διάφορες θερμοκρασίες:** Σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες για τουλάχιστον 5 χρόνια.
- σε διάφορα υλικά συσκευασίας:** Σταθερό στα δηλούμενα υλικά συσκευασίας.
 - α) Πλαστικό φυσίγγιο (dispenser) και πλαστική σύριγγα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). β) Χάρτινο κουτί που περιέχει τα φυσίγγια και τις σύριγγες για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Φυσικά και χημικά στοιχεία:

Το CAZA 2.15 Gel bait είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή gel (Gel bait), με χρώμα λευκό ως μπεζ και χαρακτηριστικά ελαφρά οσμή. Δεν είναι άμεσα εύφλεκτο, δεν είναι εκρηκτικό, ούτε διαβρωτικό.

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οικιακοί και Επαγγελματικοί χώροι Όπως εργοστάσια, Νοσοκομεία, Σχολεία, Παιδικοί σταθμοί, Γραφεία, Όροφοι, Παραγωγή τροφίμων, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Αεροπλάνα, Τρένα, Περιοχές ηλεκτρικών συσκευών και υπολογιστές.	<p>1. Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>) και Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>) οι οποίες είναι μικρού τελικού μεγέθους</p> <p>2. Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>) η οποία είναι μεγάλου τελικού μεγέθους.</p>	<p>❖ 1 σταγόνα ζελέ ανά θέση δολώσεως 1-2 θέσεις δολώσεως ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μολύνσεως να αυξηθούν οι θέσεις δολώσεως ανάλογα.</p> <p>❖ 2 σταγόνες ζελέ ανά θέση δολώσεως για την αμερικάνικη κατσαρίδα. 1-2 θέσεις δολώσεως ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μολύνσεως να αυξηθούν οι θέσεις δολώσεως ανάλογα.</p> <p>❖ 1 σταγόνα διαμέτρου 5mm αντιστοιχεί σε 0.1 γρ.</p>	Τοποθέτηση σταγόνων σε επιλεγμένα σημεία

Οδηγίες χρήσεως:

- Οι θέσεις δολώσεως και ο πληθυσμός καθορίζονται με την χρήση παγίδων με κόλλα.
- Οι θέσεις δολώσεως ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνεται η ποσότητα δολώματος, αν αυτό έχει καταναλωθεί, λόγω διαδοχικών επισκέψεων των κατσαρίδων.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή με ζωτροφές.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε σημεία, όπου ο καθαρισμός ρουτίνας μπορεί να το μετακινήσει σε επιφάνειες που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή τροφή.
- Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που σφουγγαρίζονται τακτικά επειδή το ζελέ μπορεί να αφαιρείται με το πλύσιμο.

- Να μην εφαρμοσθεί το ζελέ σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με εντομοκτόνα και να μην ψεκασθεί εντομοκτόνο επάνω στο ζελέ διότι μειώνεται η δράση του.
- Η επαφή με ύφασμα μπορεί να επιφέρει αλλοίωση του χρώματος του τελευταίου.

Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.