



ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μυκητοκτόνο με διασυστηματική δράση κατά των περονόσπορων και της αλτερνάριας σε πατάτα και τομάτα.

Το ipronalcarb (ομάδα αμιδο-καρβαμιδικών εστέρων) δρά εξειδικευμένα κυρίως εναντίον μυκήτων της τάξης Peronosporales της κλάσης των Ζομυκήτων. Γενικά το ipronalcarb θεωρείται ότι εμφανίζει αζόλογη προληπτική κυρίως δράση αλλά και ικανοποιητική θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση απορροφάται ταχέως από το φύλλωμα και κινείται μέσα στο φυτό με αποτλαστική κυρίως κίνηση. Το propineb ανήκει στη χημική ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα μονοαλκυλοδιθειοκαρβαμιδικά. Η δράση του είναι προστατευτική.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Καλλιέργεια - Εγχθρός - Δόση εφαρμογής (σκεύασμα) - Όγκος ψεκαστικού υγρού - Στάδιο εφαρμογής
Πατάτα
Περωνόσπορος (*Phytophthora infestans*) - Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*). **Δόση εφαρμογής:** 250-300γρ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. Συστηνονται προληπτικοί ψεκασμοί, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/περίοδο:** 2-3.

Τομάτα (Υπαίθρου - Θερμοκηπίου)
Περωνόσπορος (*Phytophthora infestans*) - Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*). **Δόση εφαρμογής:** 250 γρ. σκευάσματος/ήλ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα (Υπαίθρου), 100-120 λίτρα/στρέμμα (Θερμοκηπίου). Συστηνονται

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



προληπτικοί ψεκασμοί, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/περίοδο:** 2-3.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ):
• **Πατάτα:** 14 ημέρες • **Τομάτα Υπαίθρου:** 20 ημέρες • **Τομάτα Θερμοκηπίου:** 7 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Δοκιμάστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και τη ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή του.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά τον ψεκασμό να γίνεται πλύσιμο των ψεκαστικών μέσων με νερό. Να γίνονται τουλάχιστον 3 ξεπλύματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Χρήση του Melody Duo μόνο προληπτικά και κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. • Σε περιοχές που εφαρμόζονται μέχρι 6 επεμβάσεις για



τον περονόσπορο, οι μισές μπορεί να είναι με Melody Duo, ενώ όπου εφαρμόζονται περισσότερες το ένα τρίτο να είναι με Melody Duo. • **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο:** 2-3 • Σε περίπτωση εφαρμογής 2 συνεχόμενων επεμβάσεων με Melody Duo η επόμενη να γίνεται μετά από εφαρμογή 2 τουλάχιστον επεμβάσεων με σκευάσματα που δεν περιέχουν ipronalcarb και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με ipronalcarb • Σε περίπτωση εναλλαγής με μυκητοκτόνο άλλης ομάδας πρέπει να τηρείται το μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε στο καπάκι του κυτίου
Ημερομηνία λήξεως υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης: Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του Melody Duo είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Το σκεύασμα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.
Αρ. Παρτίδας: Βλέπε εσωτερική σακούλα.



Καθ. βάρος 2,5 κιλά

Βρέξιμη σκόνη (WP)
ipronalcarb: 5,5% β/β +
propineb: 61,3% β/β +
Βοηθητικές ουσίες: 26,85% β/β

Μυκητοκτόνο
με διασυστηματική δράση κατά των περονόσπορων και της αλτερνάριας σε πατάτα και τομάτα
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
• Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση από στόματος.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.



Κάτοχος της έγκρισης, υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας
Υ.Α.Α.Τ.:
6954 / 29.04.2004



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα, μπότες, κουκούλα, προσωπίδα και κατάλληλη προστατευτική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό. Η εφαρμογή να γίνεται με αυτόματο σύστημα ψεκασμού και σε περίπτωση έλλειψης αυτού να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: • Μετακινήστε τον ασθενή μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και μεταφέρετε τον σε σταθερή πλάγια θέση. • Απομακρύνετε τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε καλά το δέρμα που ήρθε σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό με αρκετή ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε καλά τα μάτια με νερό για αρκετή ώρα. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επκέτα. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΙΣ ΕΠΙΠΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

L 03 5932 11