

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ:

•Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. •Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. •Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. •Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δεήτριο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκαλέσει εμετός. Μην χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε ασθενή που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα και τα κουτιά με σκόσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ/νία Παραγωγής: Βλέπε φιάλη

L151657 GREC/11N



Topas[®]
100 EC

syngenta®

Penconazole (πενκοναζόλη)

Γαλακτωματοποίησημο υγρό (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Penconazole 10% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 89,36% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυβλ. Υπ. Αγρωτ. Ανάπτ.

Τροφ: 6489/20-6-1988

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Syngenta Crop Protection AG,
Basel, Ελβετία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής,

Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: Βί.Π.Ε. Θ. Σίνδος,

Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

400 ml e

Χη



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Ερεθίζει τα μάτια.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Βερικοκιά - Ροδακινιά: Για Οξίδιο (Podosphaera oxycanthae) για την **Βερικοκιά** και για Οξίδιο (Sphaerotheca pannosa) για την **Ροδακινιά**. Δόσεις: 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 52-125 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρέμμα. Έως 3 εφαρμογές: στην πτώση των πετάλων, στην απόσυρση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. **Αμπέλι:** Για Οξίδιο (Uncinula necator) 25-40 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 12,5-60 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Έως 2 εφαρμογές. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ψεκασμοί όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και κατά την άνθηση. Οι ψεκασμοί μπορούν να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. **Κολλοκώλη, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι:** Για Οξίδιο (Sphaerotheca spp.) 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 12,5-35 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Έως 3 εφαρμογές: 1-3 ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Η μικρή δόση συνιστάται για ψεκασμούς κάθε 7-14 ημέρες και η μεγάλη κάθε 10-16 ημέρες. **Τομάτα θερμικηπίου:** Για Οξίδιο (Leveillula taurica) *25-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή **62,5(μείνιστο) κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Έως 4 εφαρμογές: με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. **Καπνός:** Για Οξίδιο (Erysiphe cichoracearum) 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17,5-75 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Έως 3 εφαρμογές: 2-3 ψεκασμοί σε όλα τα στάδια με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. **Καλλιωπιστικά υπαίθρου:** Για Οξίδιο (Sphaerotheca spp.) 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 17,5-50 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Έως 5 εφαρμογές: μέχρι 5 ψεκασμοί ανάλογα με την ένταση της προσβολής και μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής.
2. Στο αμπέλι η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.
3. Στην Τομάτα θερμικηπίου: *Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περίπτωση χαμηλής προσβολής με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες και η μεγάλη δόση σε περίπτωση υψηλής προσβολής με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. **Στις περιπτώσεις που απαιτείται εφαρμογή όγκου ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερου από 125 λίτρα/στρέμμα θα πρέπει η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα νερό να μειωθεί αναλογικά ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση των 62,5 κ.εκ. / στρέμμα.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

1. Προληπτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ασθένειας και αποφυγή θεραπευτικών επεμβάσεων.
2. Εφαρμογές σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Βερικοκιά, Ροδακινιά: 21 ημέρες, **Αγγούρι, Κολλοκώλη, Πεπόνι, Καρπούζι** (Υ+Θ): 3 ημέρες, **Τομάτα (θερμικηπίου):** 7 ημέρες, **Καπνός:** 21 ημέρες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.